



Globele® Pharma Pvt. Ltd.

Fabricante experimentado de productos terminados y semiacabados

OMS GMP, ISO certificado, MNC Empresa de fabricación acreditada

- * **Instalaciones de dosificación de sólidos orales dedicados (tabletas, cápsulas, polvo oral seco)**
- * **Instalaciones dedicadas para formulaciones orales anticancerígenas (citotóxicas)**
- * **Unidad de granulado de compresión directa equipada con la última tecnología.**
- * **Centro de investigación y desarrollo aprobado por DSIR y en casa**

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



Globele® Pharma Pvt. Ltd.



Globele® Pharma Research Center

357-358, G. I.D.C., Sachin, Surat-394230, Gujarat, India.

Número de contacto: + 91-0261-23980 58/59/60

Email: info@globelapharma.com, rnd@globelapharma.com

www.globelapharma.com



Servicios ofrecidos

Dosis orales sólidas terminadas

En Globela Pharma estamos comprometidos con formulaciones farmacéuticas de alta calidad en varias formas con un equipo de tecnócratas calificados y con experiencia en las divisiones de R + D, Q.A, Q. C y producción. Nuestra ambición es que nuestro servicio extienda las expectativas de nuestros clientes.

- ✓ Fabricación y desarrollo de formulaciones.
- ✓ Fabricación por contrato
- ✓ Fiesta a la manufactura del partido
- ✓ Fabricación de licencia de préstamo
- ✓ Transferencia de tecnología y preparación de expedientes.
- ✓ Servicio de Investigación y Fabricación de Contratos (RAM)
- ✓ Lote de exhibición y formulación de lote F&D

Oncología (anticáncer)

Tenemos instalaciones aprobadas por la OMS-GMP para dosis orales sólidas de oncología junto con servicios públicos especializados y un equipo de personal técnico calificado y experimentado.

Mascarilla de sabor y gránulos de compresión directa

Globela Pharma es una de las pocas empresas presentes en la cadena de valor de fabricación farmacéutica de Intermedios de Formulación Farmacéutica (PFI), de DC a dosis finalizadas (FD). Ofrecemos a nuestros clientes los tres componentes de la cadena de valor de fabricación farmacéutica para mejorar la flexibilidad y la eficiencia.

DC tiene beneficios financieros

- Ahorro en gastos de capital y recursos técnicos.
- Menores costos de prueba
- Mayor utilización de activos.
- Ahorre costos de desarrollo y tecnología probada.

DOSIS ORALES SÓLIDAS TERMINADAS

GLOBELA ofrece una amplia gama de 200 productos junto con COPP y Dossiers,

Capacidad de producción / mes - Último embalaje

Pastillas	100 millones
Las cápsulas	20 millones
SRO (sobre)	3 millones
Jarabe seco y líquido	1 millones

Pastillas y cápsulas contra el cáncer dedicadas

PRODUCTOS EMBALADOS EN ESTADO DEL ARTE EN

• Ampolla • Tira • Botella • Alu-alu • Paquetes de bolsita

SEGMENTOS TERAPEUTICOS

Anticáncer (oncología)
Antibióticos y antibacterianos
Analgésico y Antiespasmódico
Anti hipertensivo

Inmunosupresores
Antimaláricos
Tos, resfriado, alergia
Antidiabéticos

Nefrología y Urología
Anti-hongos y antihelmínticos
Vitaminas, minerales y electrolitos
GIT y otros



NOMBRE DE LA CATEGORÍA	SR. NO.
GASTROLOGIA	1
ANTI FRIO, ANTI ALERGICO	5
ANTIBACTERIAL	7
ANTIFUNGAL / ANTELMINTICOS	11
ANTIMALARIAL	13
ANALGESICOS Y ANTISPAMODICOS	15
ANTIDIABETICS	19
DROGAS CARDIOVASCULARES	22
DROGAS ANTI VERTIGO	28
VITAMINAS Y MINERALES	30
ESTEROIDAL ANTI INFLAMATORIO	31
Electrolitos	32
DISFUNCION ERECTIL	33
NEFROLOGIA Y UROLOGIA	34
Número de producto	35
Producto de oncologia	39
CREMA, PINTURA, LOCIÓN, GEL Y PASTA DE DIENTES	46



URSOGLOB

Composición : TABLETAS DE ÁCIDO URSODEOXICOLÓGICO BP 300 MG / 150 MG

Indicación : Tratamiento de la cirrosis biliar primaria (PBC) y para la Disolución de pequeños a medianos radiotransparentes, cálculos biliares ricos en colesterol.


Paquete : 1 x 10, 10 x 10 de Alu Alu

BISAMED

Composición : TABLETAS DE BISACODILO BP 5 MG

Indicación : Bloqueo intestinal, dolor abdominal, malestar estomacal, laxante estimulante

Paquete : 10 x 15 de PVC de aluminio



BISOTIDINE

Composición : TABLETAS DE CIMETIDINA BP 400 MG / 200 MG

Indicación : enfermedad de reflujo gastroesofágico (ERGE), acidez estomacal, Dispepsia ácida, síndrome de Zollinger-Ellison, esofagitis.

Paquete : 1 x 20 de PVC de aluminio

MAGNESIUM

Composición : TABLETAS DE MAGNESIO 100 MG

Indicación : Baja cantidad de magnesio en la sangre. Funcionamiento normal de las células, los nervios, los músculos, los huesos y el corazón.

Paquete : 10 x 10 de PVC de aluminio



AMEGHADOM

Composición : TABLETAS DE DOMPERIDONE BP 10 MG

Indicación : Para el alivio de los síntomas de náuseas y vómitos.

Paquete : 3 x 10 de, 10 x 10 de alu PVC

ESOMEPRAGLOBE D

Composición : ESOMEPRAZOLE & DOMPERIDONE 20 MG / 10 MG

Indicación : reflujo ácido, úlceras, curar daños ácidos en el estómago y el esófago,

Paquete : 1 x 10 de, 10 x 10 de alu alu






ESOMEPRAGLOBE 40

- Composición :** TABLETAS DE MAGNESIO ESOMEPRAZOLAS 40 MG / 20 MG
Indicación : Tratamiento de la esofagitis por reflujo erosivo, prevención de nuevas hemorragias de las úlceras pépticas, tratamiento de Zollinger Síndrome de Ellison
Paquete : 1 x 14 de PVC de aluminio

HYOSCINE BUTYLBROMIDE

- Composición :** TABLETAS DE HIDROCINAS DE BUTILOMOMAS BP 10 MG
Indicación : El dolor crampabdominal, los espasmos esofágicos, el cólico renal y los espasmos vesicales mejoran las secreciones respiratorias
Paquete : 10 x 10 de PVC de aluminio



LANSOglob

- Composición :** CÁPSULAS DE LIBERACIÓN RETARDADA DE LANSOPRAZOLE USP 30 MG
Indicación : Tratamiento de la úlcera duodenal y gástrica, sintomática, enfermedad de reflujo gastroesofágico, síndrome de Zollinger-Ellison.
Paquete : 10 de Alu Alu

LOPERAGLOBE

- Composición :** CÁPSULAS DE LOPERAMIDA BP 2 MG
Indicación : Diarrea no específica aguda, diarrea leve del viajero, síndrome del intestino irritable, diarrea crónica debida a resección intestinal y diarrea crónica secundaria a enfermedad inflamatoria intestinal.
Paquete : 10 x 10 de PVC de aluminio




OMEPRAGLOBE

- Composición :** CÁPSULAS DE LIBERACIÓN RETARDADA OMEPRAZOLE USP 20 MG
Indicación : Prevenir las úlceras del tubo de tragar (esófago), enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE; reflujo ácido).
Paquete : 10 x 10 de Alu Alu

GLOMEZ-D

- Composición :** OMEPRAZOLE 20 MG Y DOMPERIDONE 10 MG CÁPSULAS
Indicación : ERGE, úlceras relacionadas con AINE, úlcera péptica asociada Síndrome de Zollinger Ellison sangrante.
Paquete : 10 x 10 de Alu Alu






DISETRON-4/8

- Composición :** TABLETAS ORIGINALMENTE DESINTEGRADAS USP 4 MG / 8 MG
Indicación : Náuseas y vómitos inducidos por la quimioterapia citotóxica. Quimioterapia y radioterapia, y para la prevención Y tratamiento de náuseas y vómitos postoperatorios (PONV)
Paquete : 10 x 10 de Alu Alu

PENTAGLOB 40

- Composición :** TABLETAS DE PANTOPRAZO USP 40 MG
Indicación : ERGE, úlceras relacionadas con AINE, úlcera péptica, hemorragia, síndrome de Elison Zollinger.
Paquete : 3 x 10 de, 10 x 10 de Alu Alu





PANGLO-DSR

- Composición :** CÁPSULAS DE SODIO (EC) Y DOMPERIDONE (SR) DE PANTOPRAZOL 40 MG / 10 MG
Indicación : Úlceras gástricas duodenales o benignas, enfermedad de reflujo ácido, Esofagitis por Relux, Dispepsia y Hinchazón.
Paquete : 3 x 10 de, 10 x 10 de Alu Alu

RABEGLOB-D

- Composición :** RABEPRAZOLE 20 MG Y DOMPERIDONE 10 MG
Indicación : Úlceras gástricas duodenales o benignas, ERGE
Paquete : 10 x 10 de Alu Alu





RABEGLOB

- Composición :** RABEPRAZOLE SODIUM TABLETAS RECUBIERTAS 20 MG
Indicación : Curación De ERGE Erosiva O Ulcerativa En Adultos. Curación De Las Úlceras Duodenales En Adultos
Paquete : 3 x 10 de Alu Alu

GLOCID-300/150

- Composición :** TABLETAS DE RANITIDINA BP 300 MG / 150 MG
Indicación : Úlcera en estómago y duodeno, malestar estomacal hipersecretor.
Paquete : Alu Alu de 30 x 10, 10 x 10 y 10 x 2 x 10





GLOCID-D

Composición : RANITIDINE HCL Y DOMPERIDONE 150 Y 10MG TABLETAS

Indicación : náuseas y vómitos intratables, úlcera duodenal benigna, Úlcera gástrica, inflamación del esófago, ácido péptico. Enfermedad, tratamiento para síntomas asociados con idiopática. o gastroparesia diabética y otras afecciones.

Paquete : 10 x 10, 3 x 10 de Alu Alu

Próximamente...

RABEPRAZOLE CON LAS CÁPSULAS DE LEVOSULPIRIDEO

ILAPRAZOLE CON LAS CÁPSULAS DE DOMPERIDONE

ILAPRAZOL CON LAS CÁPSULAS DE LEVOSULPIRURO



GLOCET-10

Composición : TABLETAS DE CETIRIZINA BP 10 MG

Indicación : Fiebre del heno, rinitis alérgica como estornudos, rinorrea, picazón, congestión nasal y lagrimeo

Paquete : 10 x 10 de PVC de aluminio

CHLORPHENIRAMINE

Composición : TABLETAS DE CLORFENIRAMINA BP 4 MG

Indicación : alergia, fiebre del heno y el resfriado común., erupción cutánea, ojos llorosos, picazón en los ojos / nariz / garganta / piel, tos, Goteo nasal, y estornudos.

Paquete : 10 x 10 de PVC de aluminio



DES LorATADINA

Composición : TABLETAS DE DESLORATADINA 5 MG

Indicación : rinitis alérgica y congestión nasal, acné, afecciones cutáneas alérgicas (por ejemplo, urticaria idiopática crónica)


Paquete : 3 x 10 de, 10 x 10 de Alu Alu

FEXOglob-180

Composición : TABLETAS DE FEXOFENADINA BP 180 MG / 120 MG

Indicación : Alivio de los síntomas asociados con la rinitis alérgica estacional, urticaria idiopática crónica

Paquete : 1 x 10 de Alu Alu



TABLETA DE DIHIDROCLORURO DE LEVOCERIZINA 5

Composición : TABLETA DE DIHIDROCLORURO LEVOCERIZINA 5 Y 10 MG

Indicación : rinitis alérgica perenne; - El alivio de los síntomas de la urticaria idiopática crónica.

Paquete : 1 x 10 de, 3 x 10 de y 10 x 10 de Alu Alu

ZUKAST

Composición : MONTELUKAST SODIO 10 MG Y LEVOCETIRIZINA HCL 5 MG
MONTELUKAST SODIO 5 MG Y LEVOCETIRIZINA HCL 2.5 MG
MONTELUKAST SODIUM 4 MG Y LEVOCETIRIZINA HCL 2.5 MG

Indicación : Inflamación de la nariz debido a una alergia. Rinitis alérgica, urticaria idiopática crónica, prevención del broncoespasmo inducida por el ejercicio.

Paquete : 1 x 10 de, 3 x 10 de y 10 x 10 de Alu Alu





LORAGLOB

Composición : TABLETAS LORATADINA USP 10 MG

Indicación : Tratamiento sintomático de la rinitis alérgica y urticaria idiopática crónica.

Paquete : 10 x 10 de Alu Alu

MONTELUKAST

Composición : TABLETAS DE SODIO MONTELUKAST 5 Y 10 MG

Indicación : to relieve the symptoms of seasonal allergies, asthma symptoms and seasonal allergic rhinitis or hay fever.

Paquete : 10 x 10 de Alu Alu



PERFECT

Composición : CETIRIZINE HCL, PARACETAMOL, FENILFRINA HCL Y TABLETAS DE GLUCONATO DE ZINC

Indicación : Congestión nasal, alergia, resfriado común, rinitis, sinusitis, fiebre y estimulante del SNC

Paquete : 10 x 10 de PVC de aluminio

PERFECT D

Composición : PARACETAMOL, DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMID, KIT DE TABLETAS DE FENILOFRINA HCL Y CPM

Indicación : alivio de la tos y síntomas del tracto respiratorio superior, incluyendo congestión nasal, Asociado con alergia o resfriado común.

Paquete : 1 x 10 de PVC de aluminio





AZBACT 500

Composición : TABLETAS DE AZITHROMICINA 100 MG / 250 MG / 500 MG

Indicación : ITR superiores e inferiores, Stis, infecciones urogenitales, gonorrea

Paquete : 1 x 3 de y 1 x 10 de Alu PVC

AZBACT

Composición : AZITHROMICINA PARA SUSPENSION ORAL 200/5 ML

Indicación : Para tratar infecciones bacterianas, sinusitis bacteriana aguda, otitis media aguda, neumonía adquirida en la comunidad, faringitis / amigdalitis, piel y estructura de la piel sin complicaciones, uretritis, cervicitis.

Paquete : 30 ML/15 ML



AZBACT-100 DT

Composición : AZITROMICINA TABLETAS DISPERSABLES 100MG

Indicación : Para el tratamiento de infecciones respiratorias, infecciones de la piel, infecciones del oído y transmisión sexual. enfermedades

Paquete : 10 x 10 de PVC de aluminio

CLINDAMYCIN

Composición : CÁPSULAS DE CLINDAMICINA HCL USP 300 MG / 600 MG

Indicación : Infecciones graves causadas por bacterias anaerobias, incluyendo Infecciones intraabdominales, infecciones de piel y tejidos blandos, Amigdalitis, Infección dental.

Paquete : 1 x 10 de Alu Alu



BACIPRO

Composición : TABLETAS DE CIPROFLOXACINA USP 500 MG / 250 MG

Indicación : exacerbaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, Infecciones broncopulmonares en la fibrosis quística o en la bronquiectasia, otitis media supurativa crónica, vías urinarias.

Paquete : 1 x 10 de Alu Alu

BACIPRO-TZ

Composición : CIPROFLOXACINA BP 500MG + TINIDAZOLE 600 MG TABLETAS

Indicación : Infecciones vaginales o estomacales, Infección de las encías, Infecciones de la piel, Infección de los pulmones, Infecciones bacterianas, Tratamiento de infecciones bacterianas, infecciones parasitarias, Infecciones de la sangre, Infecciones de pecho.

Paquete : 1 x 10 de Alu Alu





CLARITHROMYCIN

Composición : TABLETAS DE CLARITROMICINA BP 250 MG / 500 MG

Indicación : faringitis / amigdalitis, exacerbación bacteriana aguda de la bronquitis crónica, neumonía adquirida en la comunidad, Sinusitis maxilar aguda, otitis media aguda, infecciones cutáneas sin complicaciones y estructura de la piel.

Paquete : 2 x 7 de Alu Alu, 10x10 de Alu PVC

DOXYGLOBE

Composición : CÁPSULAS DE HYCLATE DE DOXYCYCLINE BP 100 MG

Indicación : Infección del tracto respiratorio, neumonía, bronquitis crónica, sinusitis, infección del tracto urinario, enfermedades de transmisión sexual, infecciones dermatológicas y oftálmicas, infecciones por rickettsias.

Paquete : 1 x 10 de Alu PVC, 10x10 de Alu PVC



GLOMYCIN

Composición : TABLETAS DE LA DIRECCIÓN DE ERITROMICINA BP 500 MG / 250 MG

Indicación : Tratamiento de URTI, LRTI, Oído, Oral, Ojos, Piel y tejidos blandos, infecciones por GIT, etc.

Paquete : 1 x 10 de Alu Alu, 10x10 de Alu PVC

PYLOGLOB KIT

Composición : OMEPRAZOLE, CLARITHROMYCIN & TINIDAZOLE 20/250/500 GM KIT
ESOMEPRAZOLE, CLARITHROMYCIN & TINIDAZOLE 40/250/500 GM KIT
KIT GM LANSOPRAZOLE, CLARITHROMYCIN & TINIDAZOLE 30/250/500

Indicación : 1.a.) .Helicobacter pylori, .Tonsilitis, faringitis, amebiasis, giardiasis, úlcera duodenal 2. Úlcera gástrica 3. Síndrome de Zollinger-Ellison 4. Enfermedad por reflujo gastroesofágico b). Reflujo ácido, úlcera, síndrome de Zollinger-Ellison 4. Enfermedad por reflujo gastroesofágico

Paquete : KIT COMBI



AQUAFLUCON

Composición : TABLETAS DE FLUCONAZOLE, AZITHROMYCIN Y SECNIDAZOLE

Indicación : Tricomoniasis, vaginosis bacteriana, descarga vaginal Debido a candidiasis, infección o infecciones mixtas con clamidia y neisseria.

Paquete : 1 x 5 de PVC de aluminio

G-LEVO 500/250

Composición : TABLETAS DE LEVOFLOXACINA USP 500 MG / 250 MG

Indicación : Comunitario: neumonía adquirida, infección no complicada de la piel y estructura de la piel, ITU no complicada frente a complicada.

Paquete : 1 x 10 de Alu Alu, 10 x 10 de Alu PVC





LINCOSIN

Composición : Cápsulas de lincomicina BP 250 y 500 MG

Indicación : Estreptococos, neumococos y estafilococos.

Paquete : 1 x 10 de Alu Alu

MOXIGLOB 400

Composición : TABLETAS DE HIDROCLORURO DE MOXIFLOXACINA 400 MG

Indicación : Sinusitis bacteriana aguda, exacerbaciones agudas de la bronquitis crónica, neumonía adquirida en la comunidad, enfermedad inflamatoria pélvica leve a moderada, infecciones complicadas de la piel y de la estructura de la piel

Paquete : 1 x 5 de PVC de aluminio



BACINOR-400

Composición : TABLETAS DE NORFLOXACINA IP 400 MG

Indicación : Tricomoniasis, vaginosis bacteriana, descarga vaginal debida a candidiasis, infección o infecciones mixtas por clamidia y neisseria.

Paquete : 30 x 10 de Alu PVC




BACIFLOX OZ

Composición : TABLETAS DE OFLOXACINA Y ORNIDAZOLE 200 Y 500 mg

Indicación : Comunitario: neumonía adquirida, infección no complicada de la piel y estructura de la piel, ITU no complicada frente a complicada.

Paquete : 10 x 10 de Alu Alu



OFLOXACIN 400 MG

Composición : TABLETAS DE OFLOXACINA USP 400 MG / IP 200 MG

Indicación : Comunitario: neumonía adquirida, infección no complicada de la piel y estructura de la piel, ITU no complicada frente a complicada.

Paquete : 10 x 10 de Alu Alu



SPARFLOXACIN

Composición : TABLETAS DE SPARFLOXACINA 200 MG

Indicación : Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Moraxella catarrhalis, Mycoplasma pneumoniae o Streptococcus pneumoniae

Paquete : 1 x 10 de PVC de aluminio





TINIDAZOLE

Composición : TABLETAS DE TINIDAZOLE 500 MG

Indicación : Infecciones vaginales (vaginosis bacteriana, tricomoniasis), infecciones parasitarias (giardiasis, amebiasis).


Paquete : 1 x 10 de PVC de aluminio

BACIFLOX OZ

Composición : CIPROFLOXACINA 500 MG + ORNIDAZOLE 500 MG TABLETAS

Indicación : Los comprimidos de BACIFLOX-OZ están indicados para el tratamiento de diarrea, infecciones ginecológicas y pélvicas con protozoos y organismos gramnegativos anaeróbicos y aerobios. También está indicado para infecciones mixtas relacionadas con la cavidad bucal y los dientes.

Paquete : 1 x 10 de y 10 x 10 de ALU ALU



Roxyglob 150

Composición : TABLETAS ROXITHROMYCIN 150 MG / 300 MG

Indicación : Es un antibiótico macrólido semisintético que se usa para tratar una variedad de infecciones bacterianas. Es usado para prevenir y tratar la infección bacteriana de los pulmones, las vías respiratorias, el tracto urinario y las capas internas de la piel.

Paquete : 10 x 10 de Alu Alu

GATIFLOXACINA

Composición : TABLETAS DE GATIFLOXACINA 200 MG / 400 MG

Indicación : GATIFLOXACINA está indicada en pacientes > 18 años. Para el tratamiento de las siguientes infecciones cuando son causadas por bacterias susceptibles. Neumonía adquirida en la comunidad causada por neumonía por estreptococo, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis.

Paquete : 1 x 10 de y 10 x 10 de Alu Alu



Próximamente....

TABLETAS VORICONAZOLAS 50 MG Y 200 MG

TABLETAS DE GEMIFLOXACINA 320 MG

TABLETAS DE LOMEFLOXACINA 400 MG

LEVOFLOXACINA Y TABLETAS DE ORNIDAZOLE



ALBAGLOB

Composición : TABLETAS DE ALBENDAZO USP 400 MG

Indicación : Tratamiento de la neurocisticercosis parenquimatosa, infecciones parasitarias, tratamiento de la enfermedad hidatídica quística del hígado, pulmón y peritoneo

Paquete : 1 x 1 de Alu PVC

CLOTRIMAZOLE

Composición : TABLETAS VAGINALES CLOTRIMAZO BP 100 MG / 400 MG

Indicación : El clotrimazol es un medicamento antifúngico que combate las infecciones causada por hongos. Clotrimazol vaginal (para uso en la vagina) Se utiliza para tratar infecciones vaginales por candida (levadura).

Paquete : Alu Alu Strip de 1 x 6



CYSTOGLYL-N

Composición : TABLETAS DE FUROATE DE DILOXANIDA 500 MG

Indicación : La diloxanida es un medicamento utilizado para tratar las infecciones por amebas. Es un Tratamiento de segunda línea después de la paromomicina cuando no hay síntomas presentes en lugares donde las infecciones no son comunes. Para personas que son sintomáticas.

Paquete : PVC de aluminio de 3 x 10

FLUCAT - 150

Composición : TABLETAS FLUCONAZOLAS 150 MG / 200 MG / 400 MG

Indicación : Coccidioidomicosis, candidiasis invasiva, candidiasis mucosa que incluye candidiasis orofaríngea y esofágica, candidemia y candidiasis mucocutánea crónica

Paquete : 1 x 10 de Alu Alu



GILGAL GRIESOLVIN

Composición : TABLETAS DE GRISEOFULVINA BP 250 MG / 500 MG

Indicación : Griseofulvin 250 MG Tablet es un antimicótico eficaz medicamento utilizado para tratar infecciones de la piel, cuero cabelludo, uñas, Pies, ingle y otras partes del cuerpo.

Paquete : 1 x 20 de PVC de aluminio

KETAGLO

Composición : TABLETAS DE KETOCONAZO USP 200 MG

Indicación : Tratamiento de infecciones fúngicas sistémicas en pacientes con fracaso o intolerancia a otras terapias: blastomicosis, coccidioidomicosis, histoplasmosis, cromomicosis y paracoccidioidomicosis.

Paquete : 1 x 10 de Alu Alu





GLOMET 400

Composición : TABLETAS DE METRONIDAZOL 400 MG Y 500 MG Y 200 MG

Indicación : Profilaxis y tratamiento de infecciones bacterianas anaerobias identificadas / sospechosas como Bacteroides, Fusobacterium, Clostridia, Bacteria, Cocos anaerobios y Gardnerella vaginalis, Trichomonas.

Paquete : 10 x 10 de y 3 x 10 de Alu PVC

SIVOSECNIDAZOLE

Composición : TABLETAS DE NEGRO 500 MG

Indicación : El secnidazol es un medicamento eficaz para tratar infecciones causadas por protozoos y ciertas cepas de bacterias anaeróbicas. Se utiliza para tratar infecciones del estómago, intestino, tracto urinario y área genital.

Paquete : 1 x 4 de PVC de aluminio



NITAZOXANIDE

Composición : TABLETAS DE NITAZOXANIDA 500 MG

Indicación : Este medicamento se usa para tratar la diarrea causada por ciertas infecciones parasitarias de los intestinos (Cryptosporidium parvum y Giardia lamblia).

Paquete : 10 x 10 de Alu Alu

AQUAFLUCON

Composición : FLUCONAZOLE AZITHROMYCIN Y SECNIDAZOLE

Indicación : Tricomoniasis, vaginosis bacteriana, descarga vaginal Debido a candidiasis, infección o infecciones mixtas con clamidia y neisseria.

Paquete : 1 x 5 de PVC de aluminio



ITRACONAZOLE

Composición : CÁPSULAS DE ITRACONAZOLE 200 MG

Indicación : Itraconazole se usa para tratar una variedad de infecciones fúngicas. Pertenece a una clase de medicamentos conocidos como antifúngicos azoles. Funciona deteniendo el crecimiento de hongos.

Paquete : 10 x 10 de PVC de aluminio



GLOSUNAT PLUS

Composición : COMPLEMENTO DE TABLETAS ARTESUNADAS 25/50/100 150/200 MG PIRIMETAMINA Y SULFADOXINA

Indicación : Como tratamiento de primera línea de la infección confirmada por *P. falciparum* malaria como primera línea o después del fracaso de la terapia con cloroquina

Paquete : 1 kit de 6 tabletas

LUMAGLOBE

Composición : ARTÍCULA 80 MG Y LUMEFANTRINA 480 MG
ARTE 40 MG Y LUMEFANTRINA 240 MG
ARTE 20 MG Y LUMEFANTRINA 120 MG

Indicación : Tratamiento de la malaria por *Plasmodium falciparum* aguda no complicada

Paquete : 1 x 6, 1 x 12 y 2 x 12 Alu Alu



LUMAGLOBE

Composición : LUMAGLOBE SUSPENSION

Indicación : Tratamiento de la malaria en niños.



Paquete : 60 ml

CHLOROQUINE PHOSPHATE

Composición : FOSFATO DE CLOROQUINA B.P. TABLETAS DE 250 MG

Indicación : Los comprimidos de fosfato de cloroquina están indicados para el tratamiento supresor y para los ataques agudos de malaria debidos a *P. vivax*, *P. malariae*, *P. ovale* y cepas susceptibles de *R falciparum*.

Paquete : 10 x 10 de PVC de aluminio



GLOSUNATE PLUS 50

Composición : ARTESUNADO 50 MG AMODIAQUINA HCL 153 MG

Indicación : Como tratamiento de primera línea de la infección confirmada por *P. falciparum* malaria como primera línea o después del fracaso de la terapia con cloroquina

Paquete : 2 x 12 de PVC de aluminio

PYMAL

Composición : DIHIDROARTEMISININA 40 Y FOSFATO DE PIPERAQUINA 320 MG TAB

Indicación : Tratamiento de la malaria por *Plasmodium falciparum* aguda no complicada

Paquete : 1 x 9 de PVC de aluminio





PIPART SUSPENSION

Composición : DIHIDROARTEMISININA 80 MG FOSFATO DE PIPERAQUINA 640 MG

Indicación : Tratamiento de la malaria en niños.

Paquete : 80 ml

PRIMAQUINE

Composición : TABLETAS DE PRIMAQUINA 7.5 MG

Indicación : La primaquina se usa después de que otros medicamentos (como la cloroquina) hayan matado a los parásitos de la malaria que viven dentro de los glóbulos rojos.

Paquete : 10 x 10 de PVC de aluminio



GLOQ - 300

Composición : TABLETAS DE SULFATO QUININO BP 300 MG Y 600 MG

Indicación : El tratamiento de la malaria por Plasmodium falciparum. Tratamiento y prevención de los calambres nocturnos en las piernas. adultos y ancianos, cuando los calambres causan la interrupción regular del sueño.

Paquete : 1 x 10 de PVC de aluminio

EVERDESTINY EVERDINE 300/375 & 600/750

Composición : ARTESUNATE 300 MG & MEFLOQUINE 375 MG

Indicación : Artesunate / mefloquine es un medicamento utilizado para tratar la malaria. La combinación se recomienda específicamente para tratar la malaria por P. falciparum sin complicaciones.

Paquete : 1 x 6 de Alu Alu



Próximamente.....

MEFLOQUINE 250 MG

PALUDRINE

ATOVAQUONE

PROGUANIL TAB BP 100 MG



ACECLOGLOB

Composición : TABLETAS ACECLOFENAC Y PARACETAMOL 100/500 MG

Indicación : Aceclofenac Paracetamol Tablet se usa para Fiebre, Dolor articular, Dolor de muelas, Frío, Dolor de cabeza, Dolor de oído y otras condiciones.

Paquete : 1x10 de, 3x10 de y 10x10 de Alu PVC

ACECLOGLOB-PC

Composición : ACECLO, CLORO Y PARA 100/500/250 MG

Indicación : El paciente usa acetaminofén o paracetamol para la fiebre, o el médico lo prescribe para el dolor de cabeza o dolores corporales. Ahora fiebre, dolor de cabeza y dolores corporales.

Paquete : 1 x 10 de, 3 x 10 de, 10 x 10 de y 20 x 10 de Alu PVC



ACECLOFENAC

Composición : TABLETAS ACECLOFENAC 100 MG

Indicación : Aceclofenac y Paracetamol Tablet se usan para la artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, osteoartritis y periartrosis de escapulo-humerosos, lumbago, ischiadina, dolor causado por el arrutismo no sistemático.


Paquete : 1 x 10 de, 3 x 10 de y 10 x 10 de Alu PVC

DICLOGLOB P

Composición : PARACETAMOL Y DICLOFENAC POTASIO

Indicación : Extracción del diente, pericoronitis, desgarro del ligamento, leve Para Moderar los Dolores

Paquete : 1 x 10 de PVC de aluminio



DICLOGLOBE

Composición : TABLETAS DE SODIO DICLOFENAC BP 50 MG
TABLETAS DE SODIO DICLOFENAC BP 100 MG
DICLOFENAC VIT. B1 + VIT. B6 + VIT. B12 TABLETAS

Indicación : Alivio de todos los grados de dolor e inflamación tales como artritis reumatoide, osteoartritis, espondilitis anquilosante.

Paquete : 1 x 10 de Alu PVC y 1 x 12 de Alu PVC



DICLOGLOBE-B

Composición : DICLOFENAC VIT. B1 + VIT. B6 + VIT. B12 TABLETAS

Indicación : Alivio de todos los grados de dolor e inflamación, como artritis reumatoide, osteoartritis, espondilitis anquilosante

Paquete : 1 x 10 de Alu Alu, 2 x 10 de Alu Alu y 3 x 10 de Alu Alu Blister





DECHLOZ MR

Composición : DICLOFENAC POTASIO, PARACETAMOL Y CLORZOAZONA TABLET 50/325 / 250MG

Indicación : Se utiliza para tratar dolores musculares, dolores de espalda, dolor dental, cólicos menstruales y lesiones deportivas. También reduce el dolor, la hinchazón y la rigidez articular causada por la artritis.

Paquete : 1 x 10 de Alu Alu, 2 x 10 de Alu Alu y 3 x 10 de Alu Alu Blister



IBUPROFEN

Composición : ANTIGÉSICOS ANTIINFLÁTICO ANTIPIRÁTICO 200/325/30 MG

Indicación : Analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios no esteroideos, Medicamentos utilizados para tratar la gota y medicamentos antirreumáticos modificadores de la enfermedad.

Paquete : PVC de aluminio de 2 x 10



IBURICH

Composición : ANTIGESICO ANTIINFLAMATORIO ANTIPIRERETICO

Indicación : Analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios no esteroides, fármacos utilizados para tratar la gota y antirreumáticos modificadores de la enfermedad.


Paquete : PVC de aluminio de 2 x 10

GLOFEN

Composición : TABLETAS DE IBUPROFENO Y PARACETAMOL 400/325 MG

Indicación : Analgésicos, antipiréticos, no esteroideos. medicamentos antiinflamatorios, medicamentos para tratar la gota y medicamentos antirreumáticos modificadores de la enfermedad

Paquete : 1 x 10 de , 10 x 10 de y 50 x 1 x 10 de Alu PVC



NABUMETON

Composición : TABLETAS DE NABUMETONA USP 500 MG NABUMETONA + PARACETAMOL 500 y 750 mg

Indicación : La nabumetona se usa para reducir el dolor, la hinchazón y la rigidez de las articulaciones debido a la artritis. Este medicamento se conoce como un medicamento antiinflamatorio no esteroideo (AINE).


Paquete : Alu Alu de 3 x 10 y 10 x 10

GLONIM-MR

Composición : NIMESULIDE 100 MG Y PARACETAMOL 325 MG TABLETAS

Indicación : Artrosis / artritis reumatoide, lesiones musculoesqueléticas, tendinitis y bursitis Dolor lumbar / espondilitis anquilosante, dismenorrea

Paquete : Alu 30 x 10's PVC





GLONIM-100



Composición : TABLETAS DE NIMESULIDA 100 MG Y 50 MG
Indicación : Dolor en la espalda baja / espondilitis anquilosante, antipirética, dismenorrea
Paquete : 50 x 10 de, 10 x 10' de Alu PVC

CITRATO DE ORFENADRINA Y PARACETAMOL

Composición : ORPHENADRINE CITRATE & PARACETAMOL 35 & 450 MG

Indicación : Orphenadrine se usa para relajar los músculos y aliviar el dolor y las molestias causadas por lesiones musculares. Puede causar somnolencia. No conduzca hasta que sepa cómo le afecta.

Paquete : 1 x 10 de, 3 x 10 de y 10 x 10 de Alu PVC




PARACETAMOL Y CAFEÍNA

Composición : TABLETAS DE PARACETAMOL Y CAFEÍNA 500 MG / 30 MG

Indicación : Las tabletas solubles de cafeína y paracetamol son un analgésico suave y antipirético formulado para dar alivio extra del dolor. Las tabletas son recomendadas para el tratamiento de los más dolorosos.

Paquete : PVC de aluminio de 3 x 10 y 10 x 10



PARACETAMOL Y DICICLOMINA

Composición : TABLETAS DE PARACETAMOL Y DICICLOMINA 500 MG / 20 MG

Indicación : Dicyclomine HCl Paracetamol Tablet se usa para el tratamiento, control, Prevención y mejora de las siguientes enfermedades, afecciones y síntomas: cólicos estomacales e intestinales, fiebre, dolor menstrual

Paquete : 10 x 10 de PVC de aluminio



TROMAX

Composición : CÁPSULAS DE TRAMADOL BP 50 MG Y 100 MG

Indicación : Dolor moderado a severo

Paquete : 50 x 10 de, 10's 10 de Aluminio PVC



TROMAX-P

Composición : TRAMADOL HCL + PARACETAMOL 50 y 500 mg

Indicación : Dolor postoperatorio, dolor dental, artrosis, dolor de bengala, espondilitis cervical

Paquete : 10 x 10 de, 3 x 10 de y 1 x 10 de Aluminio PVC





ADNIL

Composición : TABLETA DE GLIBENCLAMIDA BP 5MG Y 2.5 MG

Indicación : Glibenclamide Tablet es un medicamento antidiabético oral de acción rápida que se usa para controlar los niveles de azúcar en la sangre II pacientes diabéticos. Pertenece a un grupo de medicamentos conocidos como sulfonilureas.

Paquete : 3 x 10 de Alu Alu

GLOCLAZIDE

Composición : TABLETAS DE GLICLAZIDE USP 30 MG Y 80 MG

Indicación : Diabetes no dependiente de insulina (tipo 2) en adultos cuando las medidas dietéticas, el ejercicio físico y la pérdida de peso por sí solos no son suficientes para controlar la glucemia as.

Paquete : 10 x 10 de Alu Alu



GLOPRIDE 1

Composición : TABLETAS DE GLIMEPIRIDA USP 1MG y 2MG y 4 MG

Indicación : Tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2

Paquete : 3 x 10 de Alu Alu

GLOPRIDE 1 M

Composición : GLIMEPIRIDE Y LIBERACIÓN EXTENDIDA METFORMIN HCL
GLIMEPIRIDE Y PIOGLITAZONE & METFORMIN 2/15/500 MG

Indicación : Tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, efecto antihiper glucémico aditivo sin aumentar los efectos adversos de ninguna de las clases farmacológicas.

Paquete : PVC de aluminio de 3 x 10



GLOFORMIN

Composición : TABLETAS DE METFORMINA BP 500 MG / 850 MG / 1000 MG

Indicación : Metformin 500 MG Tablet es un medicamento eficaz de primera elección para controlar los niveles altos de glucosa en sangre en pacientes con diabetes tipo II. Se recomienda a los pacientes que mantengan un régimen de ejercicio y dieta estrictos junto con este medicamento para obtener el mejor efecto posible.

Paquete : 10 x 10 de PVC de aluminio

PIOZONE 30M

Composición : PIOGLITAZONA HCL 30 y 15 METFORMINA HCL 500

Indicación : La pioglitazona, una tiazolidindiona, aumenta la sensibilidad a la insulina en el hígado, músculo esquelético y tejido adiposo. tejidos La metformina, una biguanida, disminuye la producción de glucosa hepática, disminuye la absorción intestinal de glucosa.

Paquete : PVC de aluminio de 3 x 10






PIORIDE 30



- Composición :** TABLETAS DE HIDROCLORURO DE PIOGLITAZONA 30 MG Y 15 MG
- Indicación :** Controlar el alto nivel de azúcar en la sangre ayuda a prevenir el daño renal, la ceguera, Problemas nerviosos, pérdida de extremidades y problemas de función sexual. El control adecuado de la diabetes también puede disminuir su riesgo de Ataque al corazón o derrame cerebral.
- Paquete :** 3 x 10 de Alu Alu

VOGLIBOSE MOUTH DISSOLVING

- Composición :** TABLETAS DISOLVANTES DE BOCA VOGLIBOS 0.2 / 0.3 MG
- Indicación :** Voglibose 0.2 MG Tablet se usa para disminuir el nivel de glucosa en la sangre en pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2, especialmente cuando otros medicamentos no pueden proporcionar los resultados deseados.
- Paquete :** Alu Alu de 3 x 10 y 10 x 10



VOGLIBOSE & METFORMIN HCL

- Composición :** VOGLIBOSE & METFORMIN HCL TABLETAS 0.2 & 500 MG
- Indicación :** La metformina y la sitagliptina son medicamentos orales para la diabetes que ayudan a controlar los niveles de azúcar en la sangre. La metformina funciona Disminución de la producción de glucosa (azúcar) en el hígado y disminución de la absorción de glucosa por los intestinos.
- Paquete :** 10 x 10 de Alu Alu

STAGLOB

- Composición :** TABLETAS DE FOSFATO SITAGLIPTIN 25 MG & 50 MG & 100 MG
- Indicación :** La sitagliptina se usa con una dieta adecuada y un programa de ejercicios y posiblemente con otros medicamentos para controlar el nivel alto de azúcar en la sangre. Controlar el nivel alto de azúcar en la sangre ayuda a prevenir el daño renal, la ceguera, los problemas nerviosos, la pérdida de las extremidades y los problemas de la función sexual.
- Paquete :** Alu Alu de 3 x 10 y 10 x 10



SITAGLOB M

- Composición :** FOSFATO DE METFORMINA Y SITAGLIPTINA 1000/50, 500/50 MG
- Indicación :** La metformina y la sitagliptina son medicamentos orales para la diabetes que ayudan controlar los niveles de azúcar en la sangre. La metformina actúa disminuyendo la producción de glucosa (azúcar) en el hígado y disminuyendo la absorción de glucosa por los intestinos
- Paquete :** 3 x 10 de Alu Alu

GLICLAZIDE MR

- Composición :** TABLETAS DE GLICLAZIDE MR 30 MG Y 60 MG
- Indicación :** Diabetes no dependiente de insulina (tipo 2) en adultos cuando Las medidas dietéticas, el ejercicio físico y la pérdida de peso por sí solos no son suficientes para controlar la glucosa en sangre.
- Paquete :** 3 x 10 de Alu Alu





REPAGLINIDA

Composición : TABLETAS DE REPAGLINIDA USP 1 MG

Indicación : La repaglinida se usa sola o con otros medicamentos para controlar Niveles altos de azúcar en la sangre junto con una dieta adecuada y un programa de ejercicios. Controlar el nivel alto de azúcar en la sangre ayuda a prevenir el daño renal, la ceguera, los problemas nerviosos, la pérdida de las extremidades y las enfermedades sexuales. problemas de unción

Paquete : 10 x 10 de Alu Alu


Próximamente.....

TABLETAS SAXAGLIPTIN 2.5 / 5 MG

VOGLIBOSE, GLIMEPIRIDE Y METFORMIN

TABLETAS ACARBOSE 50 MG

DAPAGLIFLOZIN 5 MG Y 10 MG



DIPIGLO

Composición : TABLETAS DE BESILATO DE AMLODIPINA USP 5 MG / 10 MG
Indicación : Hipertensión, angina de pecho crónica estable, angina vasospástica (de Prinzmetal)
Paquete : 10 x 10 de Alu Alu

DIPIGLO-V & DIPIGLO-VH

Composición : AMLODIPINE & VALSARTAN 5/160, 10/160, 5/320 MG
 AMLODIPINE & VALSARTAN & HCT 10/160 / 12.5 MG
Indicación : Este producto se usa para tratar la presión arterial alta. La presión arterial alta baja ayuda a prevenir los accidentes cerebrovasculares, Ataques cardíacos, y problemas renales.
Paquete : 3 x 10 de Alu Alu



ATORVASTATIN

Composición : ATORVASTATIN 20 MG
Indicación : La atorvastatina se usa junto con una dieta adecuada para ayudar a reducir el colesterol y las grasas "malas" (como las LDL, los triglicéridos) y aumentar el colesterol "bueno" (HDL) en la sangre. Pertenecce a un grupo de drogas conocidas como "estatinas". Funciona al reducir la cantidad de colesterol que produce el hígado.
Paquete : 10 x 10 de Alu Alu

ATORVASTATIN & EZETIMIDE

Composición : TABLETAS IDE DE ATORVASTATIN Y EZETIMIBE 10 MG / 10 MG
Indicación : Ezetimibe / atorvastatin es un medicamento recetado, usado en combinación con dieta y ejercicio, para tratar el colesterol alto. También se usa para reducir el colesterol en personas con hipercolesterolemia familiar homocigótica.
Paquete : 10 x 10 de Alu Alu



ATORVASTATIN & FENOFIBRATE

Composición : TABLETAS DE ATORVASTATINA Y FENOFIBRACIÓN 10 Y 160 MG
Indicación : Los usos de atorvastatina incluyen el tratamiento de la dislipidemia y la prevención de enfermedades cardiovasculares. Atorvastatin reduce el nivel de colesterol, HDL y triglicéridos que son responsables de los trastornos cardiovasculares. Fenofibrar un agente hipolipemiante, prescrito para la hipercolesterolemia.
Paquete : 3 x 10 de Alu Alu

BOSENTAN TABLETAS

Composición : TABLETAS BOSENTAN 62.5 / 125 MG
Indicación : Bosentan pertenece a una clase de medicamentos llamados antagonistas de los receptores de endotelina. Bosentan se usa para tratar la hipertensión arterial pulmonar.
Paquete : 2 x 10 de Alu Alu





Plavido®

Composición : TABLETAS CLOPIDOGREL USP 75 MG

Indicación : El clopidogrel se utiliza para reducir la tasa de infarto de miocardio y los accidentes cerebrovasculares.

Paquete : 1 x 10 de Alu Alu

DRONEDARONE

Composición : TABLETAS DRONEDARONE 400 MG

Indicación : La dronedarona es un medicamento para el ritmo cardíaco que ayuda a mantener los latidos cardíacos normales en ciertas personas con trastornos del ritmo cardíaco que amenazan la vida (las cámaras superiores del corazón que permiten que la sangre fluya hacia el corazón).

Paquete : 10 x 10 de Alu Alu



ENALAPRIL

Composición : TABLETAS ENALAPRIL BP 5 MG

Indicación : Enalapril 5 MG Tablet se usa en el tratamiento de la hipertensión arterial y de otras afecciones cardíacas. Es importante mantener una dieta adecuada y hacer ejercicio regularmente al tomar este medicamento. No tome este medicamento si tiene una alergia conocida.


Paquete : 10 x 10 de Alu Alu

EPLERENONE

Composición : TABLETAS DE EPLERENONA 25 MG / 50 MG

Indicación : Este medicamento se usa solo o en combinación con otros medicamentos para tratar la presión arterial alta. Funciona al bloquear una sustancia química (aldosterona) en su cuerpo que a su vez reduce la cantidad de sodio y agua que el cuerpo retiene.

Paquete : 10 x 10 de Alu Alu



IRBESARTAN & HCL

Composición : TABLETAS DE IRBESARTÁN Y HIDROQUILOCIRATO 50 Y 12.5 MG

Indicación : (irbesartan-hydrochlorothiazide) comprimidos están indicados para el tratamiento de la hipertensión. Pacientes cuya presión arterial no está adecuadamente controlada en monoterapia.

Paquete : 2 x 7 de Alu Alu


IRBESARTÁN

Composición : TABLETAS IRBESARTÁN 150 MG / 300 MG

Indicación : Irbesartan se usa para tratar la presión arterial alta (hipertensión) y para ayudar a proteger los riñones del daño causado por la diabetes. Reducir la presión arterial alta ayuda a prevenir accidentes cerebrovasculares, ataques cardíacos y problemas renales.

Paquete : 2 x 7 de Alu Alu





FENOFIBRATE

Composición : TABLETAS DE FENOFIBRATO 145 MG / 160 MG / 1200 MG
Indicación : Fenofibrate se usa junto con una dieta adecuada para ayudar a reducir el colesterol y las grasas "malas" (como las LDL, los triglicéridos) y aumentar el colesterol "bueno" (HDL) en la sangre.
Paquete : 10 x 10 de Alu Alu

SIVO LISINOPRIL 5

Composición : TABLETAS LISINOPRIL USP 5 MG / 10 MG
Indicación : Lisinopril se usa para tratar la presión arterial alta. Reducir la presión arterial alta ayuda a prevenir accidentes cerebrovasculares, ataques cardíacos y problemas renales. También se usa para tratar la insuficiencia cardíaca y para mejorar la supervivencia después de un ataque cardíaco.
Paquete : PVC de aluminio de 2 x 14



DIPIGLO-L

Composición : AMLODIPINA Y LISINOPRIL 5/10 & 10/10 MG
Indicación : (lisinopril) (amlodipina) funciona bien para bajar la PA y prevenir el dolor en el pecho. No puede omitir dosis, y podría tener una hinchazón persistente. (lisinopril) es un buen medicamento para bajar la presión arterial que protegé la función renal.
Paquete : 3 x 10 de Alu Alu

LOSARTAN

Composición : TABLETAS DE POTASIO LOSARTANOS USP 25/50 MG
Indicación : Losartan se usa para tratar la presión arterial alta (hipertensión) y para ayudar a Protege a los riñones del daño causado por la diabetes. También se usa para bajar el riesgo de accidentes cerebrovasculares en pacientes con presión arterial alta y un corazón agrandado. Reducir la presión arterial alta ayuda a prevenir accidentes cerebrovasculares, problemas cardíacos y renales.
Paquete : 3 x 10 de Alu Alu



SCRIP-LOSARTAN HCT TABLET

Composición : TABLETAS LOSARTAN HCL USP 50 / 12.5 MG & 100 / 25MG
Indicación : Losartan se usa para tratar la presión arterial alta (hipertensión) y para ayudar a Protege a los riñones del daño causado por la diabetes. También se usa para bajar el riesgo de accidentes cerebrovasculares en pacientes con presión arterial alta y un corazón agrandado. Reducir la presión arterial alta ayuda a prevenir accidentes cerebrovasculares, problemas cardíacos y renales.
Paquete : 3 x 10 de Alu Alu

NEBIVOLOL

Composición : TABLETAS DE NEBIVOLOL 2.5 MG
Indicación : Nebivolol se usa para tratar la presión arterial alta. La presión arterial alta en disminución ayuda a prevenir accidentes cerebrovasculares, ataques cardíacos y problemas renales.
Paquete : 10 x 10 de PVC de aluminio





SCRIP

Scrip-Nifedipine Tabletas

Composición : NIFEDIPINE EXTENDED LANZAMIENTO USP 5 MG / 10 MG / 20 MG

Indicación : Puede permitirle hacer más ejercicio y disminuir la frecuencia de los ataques de angina. La nifedipina pertenece a una clase de medicamentos conocidos como bloqueadores de los canales de calcio.


Paquete : 10 x 10 de Alu Alu

RAMIGLO 5

Composición : TABLETAS RAMIPRIL BP 10 MG / 5 MG

Indicación : Ramipril 5mg Tablet es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina (ECA). Ramipril 5mg Tablet se utiliza para El tratamiento de la hipertensión o presión arterial alta.

Paquete : 3 x 10 de Alu Alu



ROSUGLOB-10

Composición : TABLETAS DE ROSUVASTATINA 5 MG / 10 MG / 20 MG

Indicación : Tratamiento de la hipercolesterolemia, Prevención de eventos cardiovasculares


Paquete : PVC de aluminio de 1 x 10

ROSUGLOB-EZ

Composición : ROSUVASTATIN Y EZETIMIBE TABLETAS 20 Y 10 MG

Indicación : La rosuvastatina se usa para reducir las LDL, los triglicéridos (colesterol y las grasas "malas") y elevar el colesterol "bueno" (HDL) en la sangre.

Paquete : 3 x 10 de Alu Alu



ROSUGLOB-F

Composición : ROSUVASTATINA Y TABLETAS DE FENOFIBRATO 10 Y 160 MG

Indicación : Este medicamento se usa para prevenir ciertos tipos de dolor en el pecho (angina). Puede permitirle hacer más ejercicio y disminuir la frecuencia de los ataques de angina. La nifedipina pertenece a una clase de medicamentos conocidos como bloqueadores de los canales de calcio.


Paquete : 3 x 10 de Alu Alu


SIMVASYN

Composición : SIMVASTATIN 5/10/20 MG SIMVASTATIN Y EZETIMIBE 10 & 10 MG

Indicación : Simvastatin se usa junto con una dieta adecuada para ayudar a disminuir colesterol "malo" y grasas (como LDL, triglicéridos) y elevan el colesterol "bueno" (HDL) en la sangre. Simvastatina y Ezetimibe se utiliza para reducir el colesterol malo y aumentar el colesterol bueno (HDL).

Paquete : 10 x 10 de Alu Alu





GLOSARTAN 40

Composición : TABLETAS TELMISARTANAS 20 MG / 40 MG / 80 MG

Indicación : Tratamiento de la hipertensión esencial en adultos, prevención cardiovascular (pacientes con h / o CHD, accidente cerebrovascular / PAD, DM tipo II con daño a órganos diana)

Paquete : 3 x 10 de Alu Alu

GLOSARTAN H 40

Composición : TELMISARTAN + HCTZ 40 y 12.5 TABLETAS

Indicación : Tratamiento de la hipertensión esencial.

Paquete : 3 x 10 de Alu Alu



VALSARTAN

Composición : VALSARTAN USP 80/160/320 MG

Indicación : El valsartán se usa para tratar la presión arterial alta y la insuficiencia cardíaca. También se usa para mejorar la posibilidad de vivir más tiempo después de un ataque cardíaco. En las personas con insuficiencia cardíaca, también puede disminuir la posibilidad de tener que ir al hospital por insuficiencia cardíaca.

Paquete : 3 x 10 de Alu Alu

SCRIP-VALSARTAN HCT

Composición : VALSARTAN & HCL USP 320 & 160 / 12.5 MG

Indicación : El valsartán y la hidroclorotiazida están indicados para el tratamiento de la hipertensión, para disminuir la presión arterial. Reducir la presión arterial reduce el riesgo de eventos cardiovasculares fatales y no fatales, principalmente accidentes cerebrovasculares.

Paquete : 3 x 10 de Alu Alu



PERINDOPRIL ARGinine

Composición : TABLETAS DE ARGININA PERINDOPRIL 25.5 / 5/10 MG

Indicación : Perindopril comparte las indicaciones de los inhibidores de la ECA como una clase, que incluye hipertensión esencial, enfermedad coronaria estable (reducción del riesgo de eventos cardíacos en pacientes con antecedentes de infarto de miocardio y / o revascularización) y tratamiento de la enfermedad cardíaca o insuficiencia cardíaca.

Paquete : 3 x 10 de Alu Alu

CAPTOGLO

Composición : TABLETAS CAPTOPRIL BP 25 MG

Indicación : El captopril es un inhibidor de la ECA. ACE significa enzima convertidora de angiotensina. Captopril se usa para tratar la presión arterial alta (hipertensión), la insuficiencia cardíaca congestiva, los problemas renales causados por la diabetes y para mejorar la supervivencia después de un ataque cardíaco.

Paquete : 10 x 10 de PVC de aluminio





CLOPIDOGREL + ASPIRINA

Composición : CLOPIDOGREL 75 MG + ASPIRIN 75 MG TABLETAS

Indicación : El clopidogrel y la aspirina son agentes antiplaquetarios, es decir, un fármaco que inhibe la capacidad de las plaquetas para agruparse como parte de un coágulo de sangre.

Paquete : 1 x 10 de PVC de aluminio

OLMESARTAN MEDOXOMIL

Composición : TABLETAS DE MEDOXOMIL OLMESARTÁN USP 20 MG / 40 MG

Indicación : Reducir la presión arterial alta ayuda a prevenir accidentes cerebrovasculares, ataques cardíacos y problemas de riñón. El olmesartán pertenece a una clase de medicamentos llamados bloqueadores de los receptores de angiotensina (BRA).

Paquete : 10 x 10 de Alu Alu



IVABRADINA

Composición : TABLAS DE IVABRADINA 5 MG Y 7.5 MG

Indicación : Corlanor está indicado para reducir el riesgo de hospitalización por empeoramiento de la insuficiencia cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica sintomática y estable con fracción de eyección del ventrículo izquierdo <35%

Paquete : 3 x 10 de Alu Alu

FUMARADO DE BISOPROLOL

Composición : TABLETAS DE FUMARADO DE BISOPROLOL USP 2.5, & 5 Y 10 MG

Indicación : Tratamiento de la hipertensión, angina de pecho crónica estable, insuficiencia cardíaca crónica estable con función ventricular sistólica reducida, además de inhibidores de la ECA y diuréticos, y opcionalmente glucósidos cardíacos

Paquete : 3 x 10 de Alu Alu



SULBUTIAMINA

Composición : TABLETAS DE SULBUTIAMINA 200 MG

Indicación : La sulbutiamina es una sustancia química artificial similar a la vitamina B tiamina. A diferencia de la tiamina, que se disuelve en el agua, la sulbutiamina se disuelve en las grasas. La sulbutiamina puede aumentar los niveles de tiamina en el cerebro.

Paquete : 3 x 10 de Alu Alu

METHYLDOPA

Composición : TABLETAS DE METHYLDOPA BP 250 MG / 500 MG

Indicación : Este medicamento se usa solo o con otros medicamentos para tratar la presión arterial alta (hipertensión). Reducir la presión arterial alta ayuda a prevenir accidentes cerebrovasculares, ataques cardíacos y problemas renales. La metildopa actúa relajando los vasos sanguíneos para que la sangre pueda fluir más fácilmente.

Paquete : 10 x 10 de PVC de aluminio





BETAHISTINE

Composición : TABLETAS DE HIDROCLORURO 8 MG / 16 MG / 24 MG

Indicación : Betahistine está indicado para el tratamiento del síndrome de Meniere, cuyos síntomas pueden incluir vértigo, tinnitus, pérdida auditiva y náuseas. El tratamiento oral inicial es de 8 a 16 mg tres veces al día, tomado preferiblemente con las comidas.


Paquete : 3 x 10 de y 1 x 10 de Alu Alu

CITICOLINE 500

Composición : TABLETAS DE CITICOLINA 500 MG

Indicación : Citicoline por sí solo puede servir para mejorar varios procesos mentales diferentes relacionados con la memoria, el aprendizaje, el razonamiento lógico y el enfoque.

Paquete : 3 x 10 de Alu Alu



GLOPENTIN 600

Composición : TABLETAS DE GABAPENTINA USP 300 MG / 600 MG

Indicación : La gabapentina se usa con otros medicamentos para prevenir y controlar las convulsiones. También se usa para aliviar el dolor en los nervios después de la culebrilla (una erupción dolorosa debido a la infección por herpes zoster) en adultos.

Paquete : Alu Alu de 3 x 10 y 10 x 10

LEVETIRACETAM

Composición : TABLETAS DE LEVETIRACETAM USP 250 MG / 500 MG

Indicación : Se utiliza en combinación con otros medicamentos para controlar las convulsiones para tratar y prevenir las convulsiones asociadas con la epilepsia. El levetiracetam no cura la epilepsia y solo sirve para controlar las convulsiones mientras se toma el medicamento.

Paquete : 10 x 10 de Alu Alu



QUETIAPINE TABLETS

Composición : TABLETAS QUETIAPINAS 400 MG Y 200 MG

Indicación : Este medicamento se usa para tratar ciertas afecciones mentales / anímicas (como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, los episodios repentinos de manía o la depresión asociada con el trastorno bipolar).

Paquete : 10 x 10 de PVC de aluminio

PAROXETINE

Composición : TABLETAS DE PAROXETINA USP 20 MG

Indicación : Las tabletas de paroxetina están indicadas para El tratamiento del trastorno depresivo mayor.

Paquete : 3 x 10 de Alu Alu





ESCITALOPRAM

Composición : TABLETAS ESCITALOPRAMAS USP 10 MG Y 20 MG

Indicación : Tratamiento de: episodios depresivos mayores, trastorno de pánico con o sin agorafobia, trastorno de ansiedad social (fobia social), Trastorno de ansiedad generalizada, trastorno obsesivo-compulsivo.

Paquete : 3 x 10 de Alu Alu

Próximamente.....

FLUNARIZINA HCL 5 MG Y 10 MG

CINARIZINA 25 MG



GTOTAL-F

Composición : FUMARADO FERROSO, CIANOCOBALAMINA, ÁCIDO FÓLICO
Indicación : Tratamiento y profilaxis de la anemia por deficiencia de hierro sin complicaciones, deficiencias de vitamina B12, anemia de Addison, deficiencia de ácido fólico y otras afecciones.

Paquete : Alu 10 x 10 dePVC

CALCIGLO D3

Composición : CARBONATO DE CALCIO CON TABLETAS DE VITAMINA D3

Indicación : Como complemento a la terapia para la osteoporosis, como terapéutico suplementación de la desnutrición por ej. en el embarazo y osteomalacia dependiente de la vitamina D. Prevención y tratamiento de la deficiencia de calcio / vitamina D, especialmente en pacientes de edad avanzada e internados en hogares.

Paquete : 3 x 10'S PVC de aluminio



G-TOTAL

Composición : MULTIVITAMINAS Y CÁPSULAS MULTIMINERALES

Indicación : Este medicamento es un producto multivitamínico usado para tratar o prevenir la deficiencia de vitaminas debido a una dieta deficiente, ciertas enfermedades o durante el embarazo. Las vitaminas son componentes importantes del cuerpo y ayudan a mantener una buena salud.


Paquete : 10 x 10 de PVC de aluminio

FOLIC ACID

Composición : TABLETAS DE ACIDO FOLICO BP 5 MG

Indicación : El ácido fólico se utiliza para prevenir y tratar los niveles bajos de sangre folato (deficiencia de folato), así como sus complicaciones, incluida la "sangre cansada" (anemia) y la incapacidad del intestino para absorber los nutrientes adecuadamente. El ácido fólico también se usa para otras afecciones con frecuencia Tablets BP 5 mg asociado con deficiencia de folato, que incluye colitis ulcerosa, enfermedad hepática, alcoholismo y diálisis renal.

Paquete : PVC de aluminio de 2 x 10



GLUCOSAMINE

Composición : TABLETAS DE GLUCOSAMINA 500 MG

Indicación : La glucosamina es una proteína de azúcar que ayuda al cuerpo a construir cartilago (el tejido conectivo duro que se encuentra principalmente en los huesos cerca de sus articulaciones). La glucosamina es una sustancia natural que se encuentra en los huesos, la médula ósea

Paquete : 10 x 10 de Alu Alu


DIOSMIN & HESPERIDIN

Composición : TABLETAS DE DIOSMIN Y HESPERIDINA 450/50 MG

Indicación : Hemorroides Enfermedad venosa crónica

Paquete : 3 x 10 de Alu Alu





BETAMETASA

Composición : TABLETAS DE BETAMETASA BP 0.5 MG

Indicación : Betamethasone 0.5 MG Tablet es similar a las hormonas esteroideas naturales (hidrocortisona / cortisona) producidas por las glándulas suprarrenales. Es utilizado para tratar la hinchazón interna y externa asociada con enfermedades como el asma, la colitis, la artritis, las alergias graves de la piel, etc.


Paquete : 10 x 10 de PVC de aluminio

DEFLAZACORT

Composición : DEFLAZACORT 1/6/18/30 MG

Indicación : Deflazacort es un esteroide que reduce la inflamación en el Deflazacort no es una cura para la distrofia muscular, pero este medicamento puede mejorar la fuerza muscular y retardar la progresión de la discapacidad.

Paquete : 10 x 10 de Alu Alu



DEXACEE

Composición : TABLETAS DE DEXAMETASA BP 0.5 / 1MG

Indicación : La dexametasona se usa para tratar enfermedades como la artritis, trastornos de la sangre / hormonas / sistema inmunitario, reacciones alérgicas, ciertas afecciones de la piel y los ojos, problemas respiratorios, ciertos trastornos intestinales y ciertos tipos de cáncer

Paquete : 10 x 10 de PVC de aluminio

PREDNISOLONE

Composición : PREDNISOLONE 5/10 MG

Indicación : Prednisolone 5 MG Tablet es un corticosteroide que es utilizado para aliviar la inflamación en condiciones como la artritis y trastornos alérgicos. Usar con precaución en pacientes con diabetes y otras enfermedades renales.

Paquete : 10 x 10 de PVC de aluminio





Polvo de esmectro dioctaédrico

Composición : DIOCTAHEDRAL SMECTITE POWDER 3.0 GM

Indicación : La esmectita dioctaédrica se utiliza para la diarrea aguda y crónica, irritable Síndrome del intestino en adultos, reflujo gastroesofágico en lactantes y otras condiciones.

Paquete : 10 SACHETS X 3.0 GM

GITRAL M

Composición : Sales de rehidratación oral BP 27.9 GM / 20.5 GM / 4.2 GM

Indicación : Tratamiento de la diarrea al revertir el proceso de deshidratación, acidosis y pérdida de electrolitos asociados con diarrea, ya sea causada por bacterias, virus, cryptosporidia o nutrición inadecuada.

Paquete : 10 sobres



GITRAL-M PLUS

Composición : SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL Y KIT DE TABLETAS DE SULFATO ZINC

Indicación : El zinc es fundamental para la capacidad del cuerpo para combatir enfermedades. Sin suficiente el zinc, el sistema inmunológico está comprometido, y el intestino es menos capaz de mantener los líquidos en el cuerpo. La suplementación con zinc puede prevenir la diarrea y la neumonía a través de varios mecanismos, en particular a través de su capacidad para restaurar la inmunidad en niños con deficiencia de zinc. Juntos, Zinc + ORS están comprobados para detener la diarrea, recuperar la fuerza e incluso salvar vidas.

Paquete : 1 x 10 de Alu PVC, 2 sobres

PROTEGER

- Niños estableciendo buenas prácticas de salud desde el nacimiento.
- Lactancia materna exclusiva durante 6 meses
- Alimentación complementaria adecuada
- Suplementos vitamínicos

EVITAR

- Niños que se enferman de neumonía y diarrea.
- Lavarse las manos con jabón
- Agua potable segura y saneamiento.
- Reducir la contaminación del aire del hogar.
- Prevención del VIH. Profilaxis con cotrimoxazol para personas infectadas por el VIH y niños expuestos

Reducir
neumonía y
Diarrea
morbilidad y
mortalidad

TRATAR

- Niños enfermos de neumonía y diarrea con el tratamiento adecuado.
- Mejor búsqueda de atención y referencia
- Gestión de casos a nivel sanitario y comunitario.
- Suministros: SRO de baja osmolaridad, zinc, antibióticos y oxígeno
- Alimentación continua (incluida la lactancia materna)



Loveglob

Composición : TABLETAS DE CITRATO DE SILDENAFIL 100 MG / 50 MG

Indicación : Sildenafil citrate 100 mg dosis inicial en hombres con disfunción eréctil en un estudio internacional, doble ciego, controlado con placebo: efecto sobre la experiencia sexual y reducción de sentimientos de ansiedad por el próximo intento de coito.

Paquete : 1 x 4 de PVC de aluminio

TADALAFIL

Composición : TABLETAS DE TADALAFIL 20 MG / 10 MG

Indicación : TADALAFIL para uso según sea necesario para la disfunción eréctil.

La dosis inicial recomendada de TADALAFIL para usar según sea necesario en la mayoría de los pacientes es de 10 mg, tomada antes de la actividad sexual prevista. La dosis se puede aumentar a 20 mg o disminuir a 5 mg, según la eficacia y la tolerabilidad individual.

Paquete : 1 x 4 de PVC de aluminio



VARDENAFIL

Composición : TABLETAS VARDENAFIL 5/10/20 MG

Indicación : Vardenafil se usa para tratar problemas de función sexual masculina (impotencia o disfunción eréctil-ED). En combinación con la estimulación sexual, vardenafil funciona al aumentar el flujo de sangre al pene para ayudar a un hombre a tener y mantener una erección.

Paquete : 10 x 10 de PVC de aluminio

FOR MEN

Composición : SILDENAFIL 50 MG Y DAPOXETINE 60 MG TABLETAS

Indicación : El Sildenafil 50 mg + Dapoxetine 60mg Tablet es la solución distintiva altamente recomendada para superar el problema de la eyaculación precoz. El principal objetivo de la droga es retrasar el proceso de eyaculación que resulta en mayores placeres sexuales para un hombre que sufre el problema de la pre-eyaculación.

Paquete : 1 x 4 de Alu Alu





RENAGLOB

Composición : KETOANALOGUES TABLETA ESENCIAL DE AMINOÁCIDOS

Indicación : Ketoanalogues / Essential Amino Acids se utiliza para el tratamiento, control, prevención y mejora de En el metabolismo proteico deficiente en insuficiencia renal crónica y uremia.

Paquete : 10 x 10 de Alu Alu

DEFERGLOB-500

Composición : TABLETAS DEFERASIROX 100/250/400/500 MG

Indicación : Este medicamento se usa para tratar los altos niveles continuos de hierro en el cuerpo causados por múltiples transfusiones de sangre. También se usa para tratar niveles altos de hierro en personas con ciertos trastornos de la sangre que no requieren transfusiones de sangre (talasemia no dependiente de transfusiones).

Paquete : 4 x 7, 3 x 10, 10 x 10 Alu Alu




FEBUGLOB 40

Composición : TABLETAS FEBUXOSTAT 40 MG / 80 MG

Indicación : Febuxostat está indicado para la prevención y tratamiento de hiperuricemia en pacientes adultos sometidos a quimioterapia para neoplasias hematológicas de riesgo intermedio a alto del síndrome de lisis tumoral (TLS).

Paquete : 3 x 10 de Alu Alu



FINASTERIDE

Composición : TABLETAS DE FINASTERIDA USP 1 MG / 1 MG

Indicación : Este medicamento se usa para tratar la calvicie de patrón masculino (alopecia androgenética) en la corona y en la mitad del cuero cabelludo. Debe ser utilizado por hombres adultos solamente. Este medicamento actúa disminuyendo la cantidad de una hormona natural del cuerpo (DHT).

Paquete : 10 x 10 de Alu Alu



SELAGLOB 400

Composición : TABLETAS DE HIDROCLORURO SEVELAMER 400/800 MG
TABLETAS DE CARBONATO PARA SEVELAMER 400/800 MG

Indicación : sevelamer se usa para disminuir los niveles altos de fósforo (fosfato) en la sangre en pacientes que están en diálisis debido a una enfermedad renal grave. La diálisis elimina algo de fosfato de la sangre.

Paquete : 3 x 10 de Alu Alu

URIGLOB

Composición : TAMSULOSINA HCL CÁPSULAS DE LIBERACIÓN MODIFICADAS 400 MG

Indicación : Tamsulosin 400 mg contiene un ingrediente activo en las cápsulas que es un llamado bloqueador alfa 1A que reduce la contracción muscular en la próstata y la uretra. Esto facilita El flujo de orina a través de la uretra ayuda a la micción.

Paquete : 3 x 10 de Alu Alu





SULFATO DE ABACAVIR Y TABLETA DE LAMIVUDINA

Composición : ABACAVIR 300/600 MG + LAMIVUDINE 150/300 MG TABLETAS

Indicación : Abacavir / lamivudina está indicado en la terapia antirretroviral combinada para el tratamiento de la infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) en adultos, adolescentes y niños que pesan al menos 25 kg. Se realizará en cualquier paciente infectado por el VIH.

Paquete : Botella de 30/60 tabletas

TABLAS DE ATAZANAVIR Y RITONAVIR

Composición : ATAZANAVIR 300 Y RITONAVIR 100MG TABLETAS

Indicación : Está indicado en terapia de combinación antirretroviral para el tratamiento de las infecciones por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH-1).

Paquete : Botella de 30 tabletas



DARUNAVIR

Composición : DARUNAVIR (DRV) 400/600/800 MG TABLETAS

Indicación : Darunavir coadministrado con dosis bajas de ritonavir está indicado en Combinación con otros medicamentos antirretrovirales para el tratamiento de pacientes con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH-1)

Paquete : Botella de 30/60 tabletas

EFAVIRENZ

Composición : TABLETAS EFAVIRENZ 200MG / 600 MG

Indicación : Este medicamento se usa con otros medicamentos contra el VIH para ayudar a controlar la infección del VIH. Ayuda a disminuir la cantidad de VIH en su cuerpo para que su sistema inmunológico funcione mejor. Esto reduce su probabilidad de tener complicaciones por el VIH (como nuevas infecciones, cáncer) y mejora su calidad de vida.

Paquete : Botella 30/90 tabletas



FAMCICLOVIR

Composición : FAMCICLOVIR 250 MG / 500 MG TABLETAS

Indicación : Famciclovir se usa para tratar infecciones causadas por ciertos tipos de virus. Trata las culebrillas causadas por el herpes zoster. También trata los brotes de herpes simple que causan herpes labial alrededor de la boca, llagas alrededor del ano y herpes genital.

Paquete : 1 x 6 de PVC de aluminio

LAMIVERY, CAMINANDO Y NEVIRAPINA

Composición : LAMIVUDINE, PASEO Y NEVIRAPINE 150 MG / 300 MG / 200 MG

Indicación : Lamivudine / nevirapine / zidovudine (3TC / NVP / AZT) es un medicamento utilizado para tratar el VIH / SIDA. Es una combinación de dosis fija de lamivudina, nevirapine y zidovudine. Se usa solo o junto con otros antirretrovirales. Es un tratamiento recomendado para las embarazadas.

Paquete : Botella de 30 tabletas





LAMIVUDINE, ZIDOVUDINE, EFAVIRENZ TABLETAS

Composición : LAMIVUDINE 150MG Y ZIDOVUDINE 300MG TABLETAS Y EFAVIRENZ 600MG

Indicación : Combivir puede causar efectos secundarios graves y potencialmente mortales. Estos incluyen una acumulación de ácido láctico en la sangre (acidosis láctica), problemas hepáticos, debilidad muscular (miopatía) y trastornos sanguíneos, como un número muy bajo de glóbulos rojos (anemia grave) o un número de glóbulos blancos más bajo que lo normal (neutropenia).

Paquete : 1 Combi KIT

LAMIVUDINE Y ZIDOVUDIN

Composición : LAMIVUDINE Y ZIDOVUDIN TABLETS 150 / 300MG

Indicación : Lamivudina / Zidovudina está indicada en la terapia de combinación antirretroviral para el tratamiento de la infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH)

Paquete : Botella de 30/60 tabletas



TABLETAS DE LOPINAVIR Y RITONAVIR

Composición : LOPINAVIR & RITONAVIR 40 + 10MG, 200 + 50MG, 100 + 25MG, 133.3 + 33.3MG

Indicación : Este producto combinado contiene dos medicamentos: lopinavir y ritonavir. Este producto se usa con otros medicamentos contra el VIH para ayudar a controlar el VIH. infección. Ayuda a disminuir la cantidad de VIH en su cuerpo para que su El sistema inmunológico puede funcionar mejor.

Paquete : Botella de 60 tabletas

TABLETAS DE NEVIRAPINA

Composición : TABLETAS NEVI RAPINAS 200 MG

Indicación : La nevirapina puede causar efectos secundarios graves y potencialmente mortales. Estos incluyen problemas hepáticos graves, erupciones cutáneas y reacciones cutáneas. Los problemas hepáticos y cutáneos pueden ocurrir en cualquier momento durante el tratamiento, pero el riesgo es mayor durante las primeras 18 semanas de tratamiento.

Paquete : Botella de 60 tabletas



TABLETAS DE RALTEGRAVIR

Composición : RALTEGRAVIR 400 MG TABLETAS

Indicación : Raltegravir está indicado en combinación con otros medicamentos antirretrovirales para el tratamiento de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH-1)

Paquete : Botella de 30/60 tabletas

RITONAVIR

Composición : RITONAVIR 100 MG

Indicación : Ritonavir está indicado en combinación con otros agentes antirretrovirales para el tratamiento de pacientes infectados con VIH-1 (adultos y niños de 2 años de edad y mayores).

Paquete : Botella de 30/60 tabletas





SOFOSBUVIR

Composición : TABLETAS DE SOFOSBUVIR 150 MG / 200 MG / 300 MG / 400 MG

Indicación : Indicado para el tratamiento de la infección crónica por el virus de la hepatitis C (VHC) como un componente de un régimen antiviral combinado para pacientes con mono infección por VHC y coinfección VHC / VIH-1

Paquete : 28/30 Botella de tabletas

EMTRICITABINE & TENOFOVIR TABLETS

Composición : TENOFOVIR Y TABLETAS DE EMTRICITABINA 300 MG Y 200 MG

Indicación : Este producto se usa con otros medicamentos contra el VIH para ayudar a controlar el VIH. infección. Ayuda a disminuir la cantidad de VIH en su cuerpo para que su sistema inmunológico funcione mejor. Esto reduce su probabilidad de tener complicaciones por el VIH (como nuevas infecciones, cáncer) y mejora su calidad de vida.

Paquete : Botella de 30/60 tabletas



TENOFOVIR AND LAMIVUDINE

Composición : TENOFOVIR 300MG + LAMIVUDINE 300MG TABLETAS

Indicación : Lamivudina / Zidovudina está indicada en la terapia de combinación antirretroviral para el tratamiento de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)

Paquete : Botella de 30/60 tabletas

EFAVIRENZ, LAMIVUDINE TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE TABLETS

Composición : EFAVIRENZ 600MG + LAMIVUDINE 300MG + TENOFOVIR 300 MG TABLETAS

Indicación : Este producto combinado se usa solo para ayudar a controlar la infección por VIH. Ayuda a disminuir la cantidad de VIH en su cuerpo para que su sistema inmunológico funcione mejor.

Paquete : Botella de 30/60 tabletas



TENOFOVIR

Composición : TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE 300MG TABLETAS

Indicación : Tenofovir Disoproxil comprimidos Los comprimidos recubiertos con película de 245 mg están indicados en combinación con otros medicamentos antirretrovirales para el tratamiento de adultos infectados con VIH-1.

Paquete : Botella de 30/60 tabletas

VCYCLOR

Composición : TABLETAS VALACYCLOVIR USP 500 MG / 1000 MG

Indicación : El valaciclovir se usa para tratar infecciones causadas por ciertos tipos de virus. En los niños, se utiliza para tratar el herpes labial alrededor de la boca. (causada por el herpes simple) y varicela (causada por la varicela zoster).

Paquete : 10 x 10 de Alu Alu





ZIDOVUDIN

Composición : ZIDOVUDIN 100 MG / 300 MG CÁPSULAS

Indicación : Zidovudine está indicado en la terapia antirretroviral combinada para adultos y niños infectados por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). La quimioprofilaxis con zidovudina está indicada para el uso en mujeres embarazadas con VIH durante las 14 semanas de gestación] para la prevención de la transmisión materno-fetal del VIH y para la profilaxis primaria de la infección del VIH en recién nacidos.

Paquete : 1 x 10 de PVC de aluminio

Próximamente.....

**EFAVIRENZ 600 MG + EMTRICITABINE 200 MG +
TENOFVIR 300 MG ABACAVIR 600MG
+ LAMIVUDINE 300MG ABACAVIR EMTRICITABINE**



ANAGLOB

Composición : TABLETAS ANASTROZOLAS 1MG

Indicación : Tratamiento adyuvante del cáncer de mama temprano HR-P, tratamiento de primera línea de HR-P o cáncer de mama localmente avanzado o metastásico desconocido, tratamiento de segunda línea del avanzado
Cáncer de mama

Paquete : PVC de aluminio de 3 x 14

PROSTAGLOB

Composición : TABLETAS DE BICALUTAMIDA USP 50 MG / 150 MG

Indicación : Tratamiento del cáncer de próstata avanzado, solo o en combinación con análogo de hormona liberadora de hormona luteinizante (LHRH)

Paquete : 1 x 10 de PVC de aluminio



GLOSULFAN

Composición : TABLETAS BUSULFAN IP 2 MG

Indicación : El busulfán se usa en pediatría y adultos en combinación con ciclofosfamida o fludarabina / clofarabina como agente acondicionador antes del trasplante de médula ósea, especialmente en leucemia mielógena crónica (LMC).

Paquete : 1 x 10 de PVC de aluminio

GLOCAPX 500

Composición : TABLETAS DE CAPECITABINA USP 150 MG / 500 MG

Indicación : Tratamiento adyuvante de pacientes tras cirugía de estadio III. (Estadio de Dukes C) cáncer de colon, cáncer colorrectal metastásico, Cáncer de mama localmente avanzado o metastásico después del fracaso de la quimioterapia citotóxica (en combinación).

Paquete : 1 x 10 de Alu Alu



CYCLOGLOB

Composición : TABLETAS DE CICLOFOSFAMIDA BP 25 MG / 50 MG

Indicación : Para el tratamiento de enfermedades malignas en adultos y niños. Como agente único, ha producido con éxito y una remisión objetiva en una amplia gama de enfermedades malignas.

Paquete : Botella de 100 tabletas

SPORGLOB

Composición : CÁPSULAS DE CICLOSPORINA USP 25 MG / 50/100 MG

Indicación : Prevención del rechazo del injerto después del trasplante de órganos sólidos, médula ósea alogénica y células stem. Tratamiento del rechazo celular en pacientes que reciben otros agentes inmunosupresores. Prevención o tratamiento de la enfermedad de injerto contra huésped (GVHD).

Paquete : Botella de 100 tabletas





DASAGLOB 50

Composición : TABLETAS DASATINIB 20 MG / 50 MG

Indicación : Nuevo diagnóstico de cromosoma Filadelfia positivo (Ph +)
Leucemia mielógena crónica (LMC) en la fase crónica.
LMC crónica, acelerada o en fase de explosión con resistencia o intolerancia al tratamiento previo, incluido el mesilato de imatinib.


Paquete : Botella de 30 tabletas

DEXACEE 4

Composición : TABLETAS DE DEXAMETASA 4 MG / 8 MG

Indicación : Tratamiento del cáncer de mama, ovario, próstata o testículo, profilaxis de la emesis inducida por emetogénicos. Quimioterapia, edema cerebral o aumento de la presión intracraneal debido a un tumor cerebral.

Paquete : 10 x 10 de y 5 x 8 de Alu PVC



ERLOGLOB 150

Composición : TABLETAS ERLOTINIBUS 150 MG

Indicación : Cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico (NSCLC) con mutaciones activadoras de EGFR, ya sea como línea I, O como tratamiento de mantenimiento con interruptor, y enfermedad estable después de la línea de quimioterapia. También se utiliza para el cáncer de páncreas metastásico

Paquete : Botella de 30 tabletas

GLOMUSTIN

Composición : CÁPSULAS DE FOSFATO DE ESTRAMUSTINA BP 140 MG

Indicación : Carcinoma de la próstata, especialmente en casos que no responden o recaen después del tratamiento con estrógenos convencionales (estilboestrol, fosfato de poliestradiol, etc.) o por orquidectomía

Paquete : 1 x 10 de Alu Alu



ETOGLOB 100

Composición : CÁPSULAS DE ETOPÓSIDO BP 50 MG Y 100 MG

Indicación : Tratamiento del cáncer de pulmón de células pequeñas (como primera línea en combinación con otros agentes), Tumores testiculares refractarios, también utilizados para .. Enfermedad de Hodgkin, Linfomas malignos (no de Hodgkin), Leucemia no linfocítica aguda

Paquete : 1 x 4's y 1 x 8's Cápsulas Botella

ZEFTIGLO

Composición : TABLETAS GEFITINIB 250 MG

Indicación : Tratamiento de pacientes adultos con cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico (NSCLC) con mutaciones activadoras de EGFR TK

Paquete : 1 x 10 de PVC de aluminio





GLOUREA 500

Composición : CÁPSULAS DE HIDROXIUREA USP 500 MG

Indicación : Leucemia mieloide crónica, cáncer de cérvix y otros tumores de tipo sólido junto con radioterapia, anemia de células falciformes (medicamento aprobado únicamente), reduce la frecuencia de crisis dolorosas
Reducir la necesidad de transfusiones de sangre.

Paquete : 10 x 10 de PVC de aluminio

GLOMATINIB 400

Composición : TABLETAS DE MESILATO IMATINIBLES 400 MG Y 100 MG

Indicación : Leucemia mieloide crónica, leucemia linfoblástica aguda, síndrome hipereosinofílico o células, mastocitosis sistémica agresiva, dermatofibrosarcoma protuberans, GIST, MDS / MPD

Paquete : 1 x 10 de Alu Alu



LENAGLOB 10

Composición : CÁPSULAS DE LENALIDOMIDA 5/10/15/25 MG

Indicación : Para el tratamiento del mieloma múltiple recién diagnosticado, síndromes mielodisplásicos, linfoma de células del manto

Paquete : 10 x 10 de PVC de aluminio

GLOTRAZ

Composición : TABLETAS DE LETROZOLE USP 2.5 MG

Indicación : Tratamiento adyuvante del cáncer de mama precoz invasivo HR-P, tratamiento adyuvante extendido del cáncer de mama invasivo dependiente de hormonas, tratamiento de primera línea para el cáncer de mama avanzado dependiente de hormonas,

Paquete : PVC de aluminio de 3 x 10



GLOMELFA

Composición : TABLETAS MELFALANAS BP 2 MG / 5 MG

Indicación : Tratamiento del mieloma múltiple y adenocarcinoma ovárico avanzado. Solo o en combinación para el tratamiento de una proporción de pacientes con carcinoma de mama avanzado.

Paquete : 1 x 10 de PVC de aluminio

MERKGLOB

Composición : TABLETAS DE MERCAPTOPURINA BP 50 MG

Indicación : Para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda. (TODOS) - Leucemia promielocítica aguda (APL) / Leucemia mieloide aguda M3 (AML M3).

Paquete : 10 x 10 de Alu Alu





TREXGLO

Composición : TABLETAS DE METOTROXATO BP 2.5 MG Y 5 MG

Indicación : Para el tratamiento de enfermedades neoplásicas, Tratamiento de casos severos de psoriasis no controlada. Para el tratamiento de adultos con artritis reumatoide grave, activa, clásica o definida.

Paquete : PVC de aluminio de 3 x 10

GLOCARBAZIN

Composición : CÁPSULAS DE PROCARBAZINA USP 50 MG

Indicación : Matulane está indicado para su uso en combinación con otros medicamentos contra el cáncer para el tratamiento de la enfermedad de Hodgkin en estadio III y IV. da.

Paquete : 1 x 10 de Alu Alu



SUNITINIB

Composición : CÁPSULAS SUNITINIB 25 MG Y 50 MG

Indicación : el tratamiento del tumor del estroma gastrointestinal (GIST) después de la progresión de la enfermedad o la intolerancia al mesilato de imatinib. el tratamiento del carcinoma de células renales avanzado (CCR)

Paquete : Botella de 30 tabletas

TAMGLOB

Composición : TABLETAS DE TAMOXIFENO BP 10 MG Y 20 MG

Indicación : Para el tratamiento del cáncer de mama, para estimular la ovulación en la infertilidad anovulatoria.

Paquete : 1 x 10 de PVC de aluminio



GLOTEMOZ - 250

Composición : CÁPSULAS DE TEMOZOLOMIDA 20 MG, 100 MG Y 250 MG

Indicación : Para el tratamiento de pacientes adultos con glioblastoma multiforme recién diagnosticado, Para el tratamiento del glioma maligno.

Paquete : 1 x 5 de PVC de aluminio

THALIGLOB - 50

Composición : CÁPSULAS DE TALIDOMIDA USP 50 MG Y 100 MG

Indicación : Como tratamiento de primera línea (en combinación con melfalán y prednisona) para el tratamiento de pacientes con Pacientes con mieloma múltiple no tratado, mayores de 65 años o no elegibles para quimioterapia de dosis alta

Paquete : PVC de aluminio de 3 x 10





EVEROGLOB 0.75

Composición : TABLETAS DE EVEROLIMUS 0.75 MG, 5 MG & 10 MG

Indicación : Tratamiento de pacientes adultos con angiomiolipoma renal asociado con esclerosis tuberosa (TSC) Tratamiento de pacientes con astrocitoma de células gigantes subependimarias (SEGA) asociado con complejo de esclerosis tuberosa (TSC)

Paquete : Botella de 30 tabletas

MYCOFET-S

Composición : TABLETAS GASTRO-RESISTENTES DE ACIDO MICOFENÓLICO 180MG / 360MG

Indicación : El ácido micofenólico está indicado en combinación con ciclosporina y corticosteroides para la profilaxis del rechazo agudo de trasplantes en pacientes adultos que reciben trasplantes renales alogénicos.

Paquete : 1 x 10 de tabletas



MYCOFET 500

Composición : TABLETAS DE MOFETIL MYCOPHENOLATE 250 MG Y 500 MG

Indicación : Para la profilaxis del rechazo agudo de trasplantes en pacientes que reciben trasplantes alogénicos renales, cardíacos o hepáticos (en combinación con ciclosporina y corticosteroides)

Paquete : 1 x 10 de tabletas

SIROGLOB

Composición : TABLETAS SIROLIMUS 1 MG Y 2 MG

Indicación : Para la profilaxis del rechazo de órganos en pacientes adultos con riesgo inmunológico bajo a moderado que reciben un trasplante renal.

Paquete : 1 x 10 de tabletas



TCOGLOB 5

Composición : CÁPSULAS DE TACROLIMUS 0.5 MG, 1 MG Y 5 MG

Indicación : Profilaxis del rechazo de trasplantes en receptores de aloinjertos de hígado, riñón o corazón.

Paquete : 1 x 10 de PVC de aluminio


BOSENTAN TABLETS

Composición : BOSENTAN 125 MG

Indicación : El tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar mejora la capacidad de ejercicio y los síntomas en pacientes con clase funcional III de la OMS

Paquete : 2 x 10 de Alu Alu





AZAGLOB

Composición : TABLETAS AZATHIOPRINE 50 MG Y 100 MG

Indicación : TPara mejorar la supervivencia de los trasplantes de órganos, como los trasplantes renales, los trasplantes cardíacos y los trasplantes hepáticos y para reducir los requerimientos de corticosteroides de los receptores de trasplantes renales.


Paquete : 10 x 10 de PVC de aluminio

URIGLOB

Composición : CÁPSULAS DE TAMSULOSINA 0.4 MG
TAMSULOSINA 0.4 MG + DUTASTERIDA 0.5 MG

Indicación : Tratamiento de los síntomas funcionales de la hiperplasia prostática benigna (HPB)

Paquete : 3 x 10 de Alu Alu



URIGLOB D

Composición : Lanzamiento modificado Tamsulosin & Dutasteride Capsules

Indicación : Tratamiento de los síntomas moderados a severos de hiperplasia prostática benigna (HPB), reducción del riesgo de retención urinaria aguda (AU R) y cirugía en pacientes con síntomas moderados a severos de HPB

Paquete : 3 x 10 de Alu Alu

DEFERGLOB-500

Composición : TABLETAS DEFERASIROX 250/400/500 MG

Indicación : Para el tratamiento de la sobrecarga crónica de hierro debida a transfusiones de sangre en pacientes de 2 años de edad y mayores.

Paquete : Alu Alu de 3 x 10 y 4 x 7



SELAGLOB 400

Composición : SEVELAMER HCL TABLETAS 400 MG Y 800 MG

Indicación : Para el control de la hiperfosfatemia en pacientes adultos que reciben hemodiálisis o diálisis peritoneal.

Paquete : 3 x 10 de Alu Alu

NILOTINIB

Composición : CÁPSULAS DE NILOTINIB 200 MG

Indicación : Nuevo diagnóstico de cromosoma Filadelfia crónico Mielógena (CM L) en la fase crónica.

Paquete : 1 x 10 de Alu Alu





ABIRAGLOB

Composición : TABLETAS DE ACETATO DE ABIRATERONA USP 250 MG

Indicación : Para el tratamiento del cáncer de próstata metastásico resistente a la castración en hombres adultos asintomáticos o levemente sintomáticos después del fracaso de la terapia de privación de andrógenos

Paquete : Botella de 12, 60 y 120 tabletas

RENAGLOB

Composición : KETOANALOGOS AMENAZOS ESENCIALES

Indicación : Prevención y tratamiento de daños debidos a un metabolismo proteico defectuoso o deficiente en la insuficiencia renal crónica en relación con un alimento proteico limitado de ≤ 40 g / d í a (para adultos)

Paquete : 10 x 10 de Alu Alu



FOSFATO DE FLUDARABINA

Composición : TABLETAS DE FOSFATO FLUDARABINA 10MG

Indicación : Tratamiento de la leucemia linfocítica crónica (CLL) de células B en Pacientes adultos con suficientes reservas de médula ósea. El tratamiento de primera línea con Fludara oral solo debe iniciarse en pacientes adultos con enfermedad avanzada, estadios III / IV de Rai (Binet etapa C) o Rai etapas I / II (Binet etapa A / B) donde el paciente tiene síntomas relacionados con la enfermedad o evidencia de enfermedad progresiva.

Paquete : Botella de 12, 60 y 120 tabletas

FLUTAMIDE

Composición : TABLETAS DE FLUTAMIDA 250 MG

Indicación : La flutamida está indicada para el tratamiento de próstata avanzada. Carcinoma en el que está indicada la supresión de los efectos de la testosterona. La flutamida se puede usar en combinación con un agonista de la LHRH, tanto al comenzar el tratamiento como en un tratamiento complementario en pacientes que ya reciben un agonista de la LHRH.

Paquete : 3 x 10 de Alu Alu





Becloglob NC

Composición :

Dipropionato de betametasona 0,025% p / p + sulfato de neomicina eq. a neomicina 0,5% p / p + clotrimazol 1% p / p crema

Indicación :

Es una combinación de Clotrimazol antifúngico, Neomicina antibacteriana y Beclomethasone.dipropionate antiinflamatorio.

1. Infecciones por hongos y bacterias de la piel.
2. Condiciones alérgicas de la piel.



Tamaño del paquete : 10 g

Becloglob NM

Composición :

Dipropionato de betametasona 0,025% p / p + sulfato de neomicina eq. a neomicina 0,5% p / p + miconazol 1% p / p crema

Indicación :

Se utiliza en el tratamiento de infecciones fúngicas de la piel.



Tamaño del paquete : 10 g

CLOB-NM

Composición :

Propionato de clobetasol 0,05% p / p + sulfato de neomicina eq. a neomicina 0,5% p / p + nitrato de miconazol 2% p / p crema

Indicación :

Ayuda a reducir la hinchazón y la irritación. Dermovate se usa para ayudar a reducir el enrojecimiento y la picazón de ciertos problemas de la piel.



Tamaño del paquete : 30 g



Glotrirag

Composición :
Clotrimazol 1% w / w Crema

Indicación :
Para el tratamiento de:
yo. Todas las dermatomycosis debidas a mohos.
y otros hongos (por ejemplo, especies de Trichophyton)
ii. Todas las dermatomycosis debidas a levaduras.



Tamaño del paquete : 30 g

KETAGLOB

Composición :
Ketoconazol 2% p / p Crema

Indicación :
Para el tratamiento de las siguientes infecciones micóticas de la piel: tinea pedis, tinea cruris e intertrigo franco.



Tamaño del paquete : 20 g

LUCIGLOB

Composición :
Luliconazol 1 % w / w Crema

Indicación :
Se utiliza en el tratamiento de infecciones fúngicas de la piel.



Tamaño del paquete : 15 g



BETAMETHASONE DIPROPIONATE, CLOTRIMAZOLE, GENTAMICIN SULPHATE CREAM

Composición :

Dipropionato de betametasona, clotrimazol, crema de sulfato de gentamicina

Indicación :

Este medicamento combinado se usa para tratar una variedad de infecciones fúngicas inflamadas de la piel, como la tiña, el pie de atleta y la inglete.

Tamaño del paquete : 15 g



Dipropionato De Betametasona

Composición :

Betamethasone Dipropionate Cream IP 0.1%

Indicación :

Indicado para el tratamiento de: eccema en cumwi.b.01,5, niños mayores de 1 año y adultos; Incluyendo eczemas atópicos y discoides; prurigonodularis; psoriasis (excluida la psoriasis en placa extendida); neurodermatosis, incluyendo liquen simple, liquen plano; y pueden ser utilizados como un complemento a sistémico Terapia de esteroides en generalizada.

Tamaño del paquete : 15 g



Silver Sulfadiazine


Composición :

Crema de sulfadiazina de plata USP 1.0% p / p

Indicación :

Su fármaco antimicrobiano tópico está indicado como complemento de la prevención y tratamiento de la sepsis de la herida en pacientes con quemaduras de segundo y tercer grado.

Tamaño del paquete : 30/50 g





Crema De Azufre Precipitada

Composición :

Crema De Azufre Precipitada

Indicación :

El azufre se usa principalmente para tratar la sarna en bebés recién nacidos y mujeres embarazadas.1 En general, se usa solo cuando hay permetrina



Tamaño del paquete : 30 g

Betamethasone Valerate, Gentamicin Sulfate, Tolnaftate and Iodochlorhydroxyquinoline Crema

Composición :

Betamethasone Valerate, Gentamicin Sulfate, Tolnaftate and Iodochlorhydroxyquinoline Cream

Indicación :

Crema combina el antiinflamatorio sostenido antiprurítico y las acciones vasoconstrictoras de Dipropionato de betametasona con la actividad antimicótica de amplio espectro del clotrimazol y la actividad antibiótica bactericida de amplio espectro del sulfato de gentamicina.



Tamaño del paquete : 30 g

Beclomethasone Crema BP

Composición :

Beclomethasone Crema BP

Indicación :

Afecciones inflamatorias de la piel, como eczema grave y dermatitis



Tamaño del paquete : 15 g



Crema de nitrato de miconazol BP

Composición :

Crema de nitrato de miconazol BP

Indicación :

Para el tratamiento de infecciones micóticas de la piel y uñas y superinfecciones debidas a bacterias Gram-positivas.



Tamaño del paquete : 15 g

Hidrocortisona Acetato Crema BP 1.0%

Composición :

Crema de acetato de hidrocortisona BP 1.0% p / p

Indicación :

Los corticosteroides tópicos están indicados para el alivio de las manifestaciones inflamatorias y pruríticas de las dermatosis sensibles a los corticosteroides.



Tamaño del paquete : 15 g

Betamethasone Dipropionate

Crema BP 0.05%

Composición :

Betamethasone Dipropionate Crema BP 0.05% p / p

Indicación :

Este medicamento se usa para tratar una variedad de afecciones de la piel (por ejemplo, eccema, dermatitis, alergias, erupción cutánea). La betametasona reduce la hinchazón, la picazón y el enrojecimiento que pueden ocurrir en este tipo de condiciones.



Tamaño del paquete : 15 g



Furoato de mometasona

Composición :

Furoato de mometasona 0,1% p / p +
Hidroquinona 2% p / p + tretinoína 0,025% p / p

Indicación :

Se utiliza en el tratamiento del melasma (parches oscuros en la piel).



Tamaño del paquete : 15 g

Terbiglob

Composición :

Clorhidrato de terbinafina al 1% p / p Crema

Indicación :

Se utiliza en el tratamiento de infecciones fúngicas de la piel.



Tamaño del paquete : 10/15 g


Sulfadiazina de plata y gluconato de clorhexidina

Composición :

Sulfadiazina de plata y crema de gluconato de clorhexidina

Indicación :

cura la mayoría de los pies de atleta (tineapedis) cura la mayoría de las patas del jock (tineacruris) y la tiña (tineacorporis) alivia la picazón, el ardor, el agrietamiento y la descamación que acompañan estas afecciones.



Tamaño del paquete : 10/15 g



Dicloglob Forte

Composición :

Diclofenac dietilamina 1.16% eq. al diclofenaco sódico al 1 w / w + Aceite de linaza 3% p / p + metilo Salicilato 10% p / p + Mentol 5% p / p + Alcohol bencilico 1% p / p Gel

Indicación :

Brinda alivio en el dolor de articulaciones, dolor de espalda, dolor de cuello, dolor de hombro, esguinces y distensiones.

Tamaño del paquete : 30 g



Clindaglob N

Composición :

Clindamicina fosfato al 1% p / p + nicotinamida 4% p / p gel (base de gel de aloe-alantoina)

Indicación :

La solución tópica de fosfato de clindamicina, el gel de fosfato de clindamicina y la loción de fosfato de clindamicina están indicados en el tratamiento del acné vulgar.

Tamaño del paquete : 30 g



Gel de salicilato de colina y clorhidrato de lidocaína

Composición :

Solución de salicilato de colina eq. a salicilato de colina 8,7% p / p + hidrocloreuro de lidocaína 2% p / p + solución de cloruro de benzalconio 0,01% p / p Gel

Indicación :

Se utiliza en el tratamiento de llagas en la boca.

Tamaño del paquete : 10 g





Poviglob

Composición :

Povidona yodo 5% p / p (0,5% p / p de yodo disponible)

Indicación :

Se utiliza para prevenir infecciones.



Tamaño del paquete : 15 g


Poviglob-O

Composición :

Povidona yodo 5% p / p (0,5% p / p de yodo disponible)

Indicación :

Se utiliza en el tratamiento de infecciones bacterianas.



Tamaño del paquete : 15 g

Ungüento de ácido salicílico

Composición :

Ungüento de ácido salicílico

Indicación :

El ácido salicílico se usa en la piel para tratar la psoriasis y otras afecciones de la piel seca y escamosa. Este medicamento también se usa para ayudar a eliminar las heridas de las verrugas, las plagas de las manos y las plantas de los pies.



Tamaño del paquete : 25 g



Becloglob

Composición :

Dipropionato de beclometasona 0,025% p / v +
clotrimazol 1% p / v loción

Indicación :

Se utiliza en el tratamiento de infecciones fúngicas
de la piel.



Tamaño del paquete : 15 g

Ketaglo

Composición :

Ketoconazol 2% p / v Loción

Indicación :

Se utiliza en el tratamiento de infecciones fúngicas de la piel.



Tamaño del paquete : 15 ml

Permeglob

Composición :

Permetrina 5% p / v loción

Indicación :

Es útil en el tratamiento de la sarna.



Tamaño del paquete : 50 ml



Enjuague bucal de gluconato de clorhexidina con mentol

Composición :

Enjuague bucal de gluconato de clorhexidina con mentol

Indicación :

Prevención de la placa en ausencia de cepillado.
Prevención y tratamiento de la gingivitis y la candidiasis oral.



Tamaño del paquete : 100 ml

Boca de nitrato de potasio, monofluorofosfato de sodio y gel medicado con triclosán

Composición :

Nitrato de potasio, triclosán con gel medicado con fluoruro

Indicación :

Proporciona protección contra la sensibilidad dolorosa de los dientes debido al frío, el calor, los dulces, etc. Ayuda en la prevención de caries dentales.



Tamaño del paquete : 50 g

Metronidazol Gel BP

Composición :

Metronidazol Gel BP

Indicación :

El tratamiento de la inflamación aguda.
Exacerbaciones de la rosácea.



Tamaño del paquete : 30 g



Globela Pharma Pvt. Ltd.

Instalaciones de pomadas dedicadas



ANALGÉSICO

Diclofenac Gel 1% w / w
Dimethindene Gel 0.1%
Moov Cream
Salicilato de metilo 30% p / p + mentol - 10% p / p +
Alcanfor 4% w / w en una base de crema
Diclofenac dietilamina Aceite de linaza, Mentol, Metil
Salicilato, Capsaicina, Alcohol Bencílico

ACNE VULGARIS / PIMPLES

Azitromicina 2% + Adaphalene 1% +
Crema / Gel Aloe Vera
Gel de ketoprofeno 2% p / p
Gel de peróxido de benzilo al 5%
Gel de Hidroquinona
Gel Tretinoin
Azitromicina 2% Gel
Clindamicina Gel & Crema
Gel Adaphelline
Fosfato de clindamicina, nicotinamida, adapaleno

Antiinfeccioso

Clobetasol, miconazol, crema de sulfato de gentamicina
Neomicina y pomada de bacitracina
Gel de neomicina
Neomicina, sulfato de polimixina B y pomada de
bacitracina Crema de nitrofurazona
Crema de óxido de zinc
Ungüento de sucralofato
Gel de gentamicina
Ácido láctico 10% + urea 10% ungüento
Crema Soframicina 1%
Propionato de clobetasol, sulfato de neomicina,
miconazol Nitrato, Clotrimazol, Sulfato De Gentamicina

ANTI-FUNGAL

Miconazol Gel Bucal 2%
Crema vaginal de clotrimazol al 1% y 2% p / p
Ungüento de nistatina
Crema De Nistatina
Crema de miconazol 2% p / p
Crema de Clotrimazol 1% p / p
Crema de terbinafina 1% p / p
Permetrina 5% Crema
Crema de Ketoconazol 2%

ESTEROIDE

Mometasone Furorate ungüento
Crema de Mometasone Furorate
Crema de clobetasol al 0.05% p / p
Ungüento de clobetasol al 0,05% p / p
Ungüento de ácido salicílico al 5% + mometasona al
0.1% p / p Crema de hidrocortisona
Ungüento de hidrocortisona
Crema Valerada De Betametasona
Acetonido de fluocinolona, nitrato de miconazol,
neomicina Sulfato
Dipropionato de beclometasona + sulfato de neomicina
0.5% p / p + clotrimazol 2% p / p crema y loción

ANTIBACTERIAL

Crema de ácido fusídico 2% p / p
Ungüento de Fusidato de Sodio 2% p / p

ANTIVIRULENTO

Crema de aciclovir 5% p / p
Crema De Peniciclovir

ANTI-PROTOZOAL

Gel de metronidazol al 1% p / p

ANTICOAGULANTE

Heparina Sódica (en base hidroalcohólico) IP ... 500 UI
Alcohol absoluto (95%) IP ... 30% v / v en una base de gel

ANTIBIÓTICO

Fusidic Acid 2% + Betamethasone 0.05% Cream w / w
Ungüento de mupirocina

ANTISÉPTICO

Metronidazol 1% + gluconato de clorhexidina
Sodio 0.25% Gel 10 g

ANTI-FUNGAL + BACTERIAL + INFECCION

Betametasona, clotrimazol, crema de sulfato de neomicina
Betametasona, miconazol, crema de sulfato de gentamicina
Betametasona + Cliquinol Crema
Miconazol + Flucinolone acetónide ungüento

Antimicrobiano

Crema de sulfadiazina de plata al 1%

ANESTESIA LOCAL

Gel de lidocaína 2%
Benzocaine Gel 20% USP

LUBRICACIÓN

Ungüento de lubricación vaginal

OTROS

Fluconazol pintura para la boca 0.5%
Tribenoside 5% + lidocaína 2% w / w
Vicks
Ácido flufenámico + ácido salicílico + mucopolisacárido
Crema Hidratante De Gel
Ungüento de azufre
Ungüento de tacrolimus
Ungüento de alquitrán de carbón y ácido salicílico
Gluconato de clorhexidina 7.1% en gel
Alprostadil en 100 mg de crema (3 mg / g)
Gel para el cabello
Hidroquinona, Tretinoin, Furate De Mometasone, Fluocilone
acetónida
Ungüento de mupirocina
Crema De Nadifloxacina
Povidone Iodine, Metronidazole, Onidazole Ointment
Crema de luliconazol
Nitrato de Sertaconazol Crema
Loción de Permethrine
Nitrato de potasio, Mono fluorofosfatos de sodio, Triclosen

FINISH FORMULATION

CEFALOSPORINAS Y PRODUCTOS BETA LACTAM

PRODUCTOS CEFALOSPORINAS

FUERZA

Cefixima para suspensión oral IP	25 mg + 5ml /50 mg +5 ml /100 mg+5 ml
Cefixima para suspensión oral USP	200 mg
Tabletas Dispersables Cefixime IP	50/100/200 mg
Cefixime Tablets IP	100/200 mg
Cefixima Tablas USP	400 mg
Cefixima y pastillas dispersables de potasio clavulánico	50 + 31.25 mg /100 + 62.5 mg
Cefixima y Clavulanato de Potasio de Potasio	200 mg + 125 mg
Cefixima y tabletas de ofloxacina	100 + 100/200 + 200 mg
Cefuroxima Axetil Dispersable	125 mg
Cefuroxima Axetil Tablets USP	250/500 mg
Cefuroxima Axetil para Suspensión Oral	125 mg + 5 ml
Cefuroxima Axetil y tabletas de clavulanato de potasio	125 +31.25 mg/250 + 62.5 mg/ 250 + 125 mg/500 + 62.5 mg
Gránulos de cefpodoxima para suspensión oral.	50mg + 5ml
Gránulos de potasio de cefpodoxima y clavulanato para suspensión oral	50 mg +31.25/5ml/ 100mg +62.5/5ml
Cefpodoxime Proxetil Tablet	100/200 mg
Cefpodoxime Proxetil & Ofloxacina Tablet	100+100/100+200/200+100/200+200 mg
Cefpodoxime Proxetil y comprimido de clavulanato de potasio	100+62.5/200+125 mg
Suspensión oral de cefadroxilo	125mg/5ml
Cefadroxil comprimidos dispersables	250mg
Cefadroxil & Clavulanato Gránulos de potasio para suspensión oral	250 mg + 62.5 mg/5 ml
Cefadroxilo y tabletas de ácido clavulánico	250+62.5/500+125 mg
Tabletas de cefadroxilo	500 mg
Cefalexina para suspensión oral.	125mg/5ml
Cápsulas de Cefalexina	250/500 mg
Tabletas dispersables de cefalexina	125/250 mg
Cefdinir para Suspensión Oral USP	125mg/5ml
Cefdinir Cápsulas USP	300mg

PRODUCTOS DE BETALACTUM

FUERZA

Cápsulas de amoxicilina	250/500mg
Amoxicilina Susp.	125 mg & 250 mg/ 5 ml
Amoxicilina + suspensión de ácido clavalúnic	125 mg /31.5mg/5ml
Amoxicilina + suspensión de ácido clavalúnic	200 mg / 28.5mg/5ml
Amoxicilina + ácido potásico F.C. Pastillas	250 mg/125 mg
Amoxicilina + Clavulanato de potasio Susp.	250 mg/62.5mg/5ml
Amoxicilina + Clavulanato de potasio Susp.	400 mg/57mg/5ml
Amoxicilina + ácido Clavalunic F.C. Pastillas	500 mg/125 mg
Tabletas de amoxicilina	250mg
Ampicilina + Cloxacilina Cápsulas	250 mg/250 mg
Tabletas dispersables de ampicilina	250 mg



Gustos de compresión enmascarados y de compresión directa

Intermedios de la formulación farmacéutica (gránulos de compresión directa) - DC

¿Qué es un DC?

DC es el producto intermedio entre una API y una dosis finalizada. La proporción de que DC podría ser subcontratado según el requerimiento del cliente sin mucho riesgo tecnológico al final. El cliente preparará gránulos con calidad comprobada y datos de estabilidad para cumplir con el estándar internacional.

¿Por qué es la compresión directa de gránulos?

Los gránulos de CC se toman directamente de los tambores a una tolva, donde se comprimen directamente en tabletas. Disminuye el costo general para los fabricantes y, a su vez, los clientes, lo que finalmente resulta en una disminución del costo del producto para el consumidor final.

Beneficios de los gránulos de compresión directa.

Ahorre tiempo en el proceso: reduzca los costos de desarrollo del proveedor, simplifique la administración de la cadena de suministro, reduzca los costos de prueba, reduzca los gastos de capital, los beneficios regulatorios, desarrolle el plegado en seco con otras API

Propiedades deseadas: Llevar a los fabricantes de dosis terminadas a obtener resultados favorables de sus estudios de bioequivalencia.

Mezcla en seco: Tenemos la capacidad para que algunas PFI se mezclen en seco con otras API sin la necesidad de una granulación adicional para obtener una mezcla homogénea.

Respaldamos nuestra línea de producción con GMP y la infraestructura de fabricación de GMP de la OMS. Para respaldar nuestros Intermedios de Formulación Farmacéutica tenemos una fuerte palabra de respaldo Vincular con el fabricante API para DMF.

Producto directo de tambor a tolva con fórmula única.

- Gránulos de compresión directa de liberación sostenida - Metformin SR apto para tabletas de 500 mg, 850 mg y 1 gm
- Liberación prolongada
- Lanzamiento rapido
- Test de enmascaramiento de fórmula para suspensión pediátrica.

GRÁNULOS DE COMPRESIÓN DIRECTA (DC)

Ciprofloxacina	65%, 75%	Lomefloxacina	75%
Ibuprofeno	66%, 70%, 90%	Amlodipina	1.35%
Ácido ascórbico (Vit. C)	90%	Rosuvastatina	3.13%, 6.25%, 13.0%
Paracetamol	83%, 66%, 90%, 95%	Clarithromicina	60%
Metformina	90%, 95%	Secnidazol	65%
Metformina SR	75%	Finasteride	4%
Telmisartán HCL	60%	Albendazole DC	49%
Metronidazole DC	80%, 90%	Gránulos premezclados de doxiciclina	50%
Naproxen DC	80%, 90%	Azitromicina dc	60%
Atenolol dc	90%	Furosemida dc	71%
Betahistina DC	8/16/24%	Citrato de sildenafil	16.12%
Sevelamer HCL DC	75%, 84%	Ofloxacina	57.14/62.89%
Aceclofenaco	50%	Carbamazepina	1.36%
Atorvastatina	6.66/13.33%	Gilbenclamida y Metformin	68.96/0.68%
Clopidogrel	26.78%	Gilbenclamida	1.36%
Fluconazol	50%	Lisinopril	2.50%
Paracetamol y cafeína		Ciprofloxacina (gránulos enmascarados de sabor)	20%
Meloxicam	65%	Azitromicina (gránulos enmascarados de sabor)	7.5%, 20%
Simvastatina	13.33%	Artemeter y lumefantrina (gránulos enmascarados de sabor)	
Tindazol	65%	Clarithromicina (gránulos enmascarados del gusto)	22%
Ketoprofeno ODT	60%	Ibuprofeno (gránulos enmascarados del gusto)	10%



Globelá Pharma Pvt. Ltd.
*"Let's raise awareness of **CANCER**
 and encourage it's prevention,
 detection & treatment."*



FORMULACIÓN DE ACABADO (ONCO)



Instalaciones dedicadas contra el cáncer (CYTOTOXIC) formulaciones acabadas ORALES

<i>Producto de oncología</i>	<i>Nombre de la marca</i>	<i>Fuerza</i>
Abiraterona tabletas	ABIRAGLOB	250 mg
Pastillas de anastrozol	ANAGLOB	1 mg
Tabletas de Bicalutamida	PROSTAGLOB	50/150 mg
Tabletas de busulfán	GLOSULFAN	2 mg
Cápsulas De Capecitabina	GLOCAPX	150 / 500 mg
Tabletas de ciclofosfamida	CYCLOGLOB	25/50 mg
Cápsulas de ciclosporina	SPORGLOB	25/50/100 mg
Tabletas Dasatinib	DASAGLOB	50 mg
Pastillas de erlotinib	ERLOGLOB	150mg
Cápsulas De Estramustina	GLOMUSTIN	140mg
Cápsulas de Etopósido	ETOGLOB	50/100 mg
Tabletas de fosfato de fludarabina	-	10 mg
Tabletas de flutamida	-	250 mg
Tabletas de Gefitinib	ZEFTIGLO	250mg
Cápsulas de hidroxiurea	GLOUREA	500 mg
Cápsulas / tabletas de mesilato de imatinib	GLOMATINIB	100 / 400mg
Cápsulas de lenalidomida	LENAGLOB	5/ 10/ 15/ 25mg
Tabletas de melfalán	GLOMELFA	2/5mg
Comprimidos de mercaptopurina	MERKGLOB	50 mg
Metotrexato	TREXGLO	2.5/5/10 mg
Cápsulas De Procarbazina	GLOCARBAZIN	50 mg
Cápsulas de sunitinib	SUTINIB	25/ 50 mg
Pastillas de Tamoxifeno	TAMGLOB	10 / 20 mg
Cápsulas De Temozolomida	GLOTEMOZ	20/100/250 mg
Cápsulas de talidomida	THALIGLOB	50 / 100 mg
INMUNOSUPRESOR	Nombre de la marca	Fuerza
Tabletas de azatioprina	AZAGLOB	50/100 mg
Tabletas de dexametasona	DEXACEE	4 / 8 mg
Tabletas de Letrozol	GLOTRAZ	2.5 mg
Tabletas de Everolimus	-	0.75/5/10 mg
Micofenolato tabletas de mofetilo	MYCOFET	250/500 mg
Tabletas Sirolimus	SIROGLOB	1 mg
Cápsulas de tacrolimus	TCOGLOB	0.5/1/5 mg
Tabletas de ácido micofenolato	MYCOFET-S	180/360 mg



Globela® Pharma Pvt. Ltd.

Instalaciones dedicadas de dosificación oral sólida



DROGAS CARDIOVASCULARES

Amlodipina	5/10 mg
Amlodipine & Valsartan	5/160, 10/160 & 5/320 mg
Amlodipine Valsartan y tableta HCTZ	10/160/12.5 mg
Atorvastatina	10/20 mg
Atorvastatina y Ezetimiba.	10/10 mg
Atorvastatina y fenofibrato	10/160 mg
Bosertan	62.5/125 mg
Clopidogrel	75 mg
Dronedarona (como dodecitrato) recubierto con película	25 mg
Eaapril	5 mg
Eplerenona	25/50 mg
Fenofibrato	145/160/200 mg
Irbesartan	150/300 mg
Irbesartan + Hidroclorotiazida	150/12.5 mg
Lisinopril	5/10 mg
Lisinopril + Amlodipine	5/10, 10/10 mg
Losartan & Hydrochlorothiazide	50/12.5 mg
Losartán de potasio	25/50 mg
Metildopa	250 mg
Nifedipine ER	2.5 mg
Ramipril	5/10/20 mg
Rosuvastatina	5/10 mg
Rosuvastatina & Ezetimibe	10/20 mg
Rosuvastatina + Fenofibrato Micronizado	20/10 mg
Simvastatina	5/10/20 mg
Simvastatina + Ezetimiba	10/10 mg
Telmisartán	20/40/80 mg
Telmisartán y Hidroclorotiazida	40/12.5 mg
Valsartán	80/160/320 mg
Valsartán + Hidroclorotiazida	320 & 160/12.5 mg
Perindopril Arginine Tablets	2.5/5/10 mg
Tabletas de Ivabradina	5/7.5 mg
Pastillas de Fumarato de Bisoprolol	2.5/5/10 mg
Tabletas de salbutamina	200 mg

CNS

Betahistina HCL	8/16/24 mg
Citicolina	500 mg
Gabapentina	300/600 mg
Levetiracetam	250/500 mg
Quetiapina	400 mg
Pastillas de paroxetina	20 mg
Tabletas de Escitalopram	10/20 mg

VITAMINAS Y MINERALES

Tabletas de ácido ascórbico	100/500mg
Carbonato de calcio (500 mg) con vitamina D3	---
Gránulos de colecalciferol	1 g
Sulfato ferroso (100 mg) y ácido fólico.	0.5 mg
Ácido fólico	5 mg
Cápsulas multivitamínicas	---
Dosmin y Hesperidina	450/50 mg

ANTIFUNGAL / ANTELMINTICOS

Albendazol	400 mg
Clotrimazol vaginal	100 mg
Durocanida furoato	500 mg
Fluconazol	150/200/400 mg
Griseofulvina	250/500 mg
Ketoconazol	200 mg
Metronidazol	200/400 mg
Secnidazol	500 mg
Tinidazol	500 mg
Itraconazol	200 mg

DISFUNCION ERECTIL

Citrato de sildenafil	50/100 mg
Tadalafil	10/20 mg
Vardenafil	5/10/20 mg

ANTIPALÚDICO

kit de sulfatoxina pirimetamina y artesunato	25/50/100/250 KT
Artemeter y Lumefantrina	20/120 mg, 40/240 mg, 80/480 mg
Artemether & Lumefantrine Dry Susp.	60 ml
Fosfato de cloroquina	250 mg
Combipack de Artesunato y Amodiaquin	160/320 mg
Dihydroartemisinina y piperquina	40/320 mg
Dihydroartemisinina & Piperquine Dry Susp.	80/640 mg
Tabletas de primaquina	7.5/15 mg
Sulfato de quinina	300/600 mg
Artemeter + Mefloquina	300/375/600/750 mg

NEFROLOGIA Y UROLOGIA

Tabletas alfa cetoanalógicas y aminoácidos esenciales	
Deferasirox	100 / 250 / 400 / 500 mg
Febuxostat	48/96 mg
Tableta de Finasteride	1/5 mg
Carbonato de sevelamer	400/800 mg
Clorhidrato de sevelamer	400/800 mg
Tamsulosin & Dutasteride capsulas	400 / 500 mcg
Tamsulosina HCL y Cápsulas de Finasteride	400 mcg & 5 mg
Cápsulas de tamsulosina HCL	400 mcg

ARV PRODUCTO

Efavirenz	200/600 mg
Famciclovir	250/500 mg
Lamivudina + Zidovudina + Efavirenz Tabletas	
Lamivudina + Zidovudina + Nevirapina Tabets	
Lopinavir + Ritonavir Tablets	200/50 mg
Tabletas de nevirapina	200 mg
Sofosbuvir	150/200/300 mg
Tenofovir + Emtricitabina	300/200 mg
Valaciclovir	40/80 mg
Zidovudina	100/300 mg
Tenofovir + Lamivudina	300/300 mg
Lamivudina + Zidovudina	150/300 mg
Emtricitabina + Tenofovir + Efavirenz	200/300/600 mg
Tenofovir	300 mg
Abacavir + Lamivudina	300/150 + 600/300 mg
Raltegravir	400 mg
Ritonavir	100 mg
Darunavir	400/600/800 mg
Atazanavir + Ritonavir	300/100 mg

ESTEROIDAL ANTI INFLAMATORIO

Betametasona	0.5 mg
Deltazacort	1/6/18/30 mg
Dexametasona	0.5/ 1 mg
Prednisolona	5/10 mg

ANALGESICOS Y ANTISPASMODICOS

Aceclofenac + Paracetamol	100/500 mg
Aceclofenac, Paracetamol y Cloroxazona	100/500/250mg
Celecoxib	200mg
Diclofenac Potassium & Paracetamol	50 / 500 mg
Diclofenaco sódico	50/100 mg
Diclofenaco Sodio + Vit. B1 + Vit B6 + Vit B12 tabletas	
Clorhidrato de Drotaverina.	40/80 mg
Etoricoxib	90/120 mg
Ibuprofeno	200/400 mg
Ibuprofeno, paracetamol y cafeína	200/ 325/30 mg
Indometacina	25 mg
Nebumetona	600/760 mg
Nebumetona y paracetamol	600/600 mg
Nimesulide	50/100 mg
Orfenadrina + Paracetamol	35/450 mg
Paracetamol y cafeína	500/30 mg
Paracetamol & Dicyclomin	500/20 mg
Tramadol	50/100 mg
Tramadol + paracetamol	50/500 mg

GASTROLOGIA

Bisacodilo	5 mg
Cimetidina	200/400 mg
Compuesto de magnesio (antiácido)	---
Domperidona	10 mg
Esomeprazol y domperidona	20 / 10 mg
Esomeprazol Mag. Di & tri bicrato	20/40 mg
Bromuro de butilo de hioscina	10 mg
Lansoprazol	30 mg
Loperamida	2 mg
Omeprazol	20 mg
Ondansetron	4 / 8 mg
Pantoprazol y Domperidona	40 mg/10 mg
Rabeprazol y Domperidona	20 mg/10 mg
Rabeprazol Sódico	20 mg
Ranitidina	150 / 300 mg
Ranitidine HCL & Domperidone	150/10 mg
Ácido Ursodeoxicólico	300 / 150 mg

ANTI FRIO, ANTI ALERGICO

Clorfeniramina	4 mg
Cetirizina	10 mg
Desloratadina	5 mg
Fexofenadina HCL	120/180 mg
Levocetirizina	5/10 mg
Levocetirizine HCL & Montelukast	5/10 mg
Loratidina	10 mg
Montelukast	5/10 mg
Paracetamol (500 mg) + fenilefrina	
Clorhidrato (5 mg) + Cetirizina + Gluconato de zinc	
Paracetamol, Dextrometorfano Hidrobromida,	
Clorhidrato de fenilefrina y Kit de tabletas de CPM	

ANTIBACTERIAL

Azitromicina	100/250/500 mg
Azitromicina seca sup.	200/ 5 ml
Ciprofloxacina	250/500 mg
Ciprofloxacina y Tinidazol	500 / 600 mg
Claritromicina	250/500 mg
Clindamicina	300/ 600 mg
Doxiciclina	100 mg
Estearato de eritromicina	250/500 mg
Esomeprazol, Claritromicina y Tinidazol	40 / 250 mg / 500mg lit
Fluconazol, azitromicina, secnidazol	150 mg / 1gm / 1gm lit
Lansoprazol, Claritromicina y Tinidazol	30 / 250 mg / 500mg lit
Omeprazol, Claritromicina y Tinidazol	20 / 250 mg / 500mg lit
Levofloxacina	250/500 mg
Lincomicina	250/500 mg
Moxifloxacina	400 mg
Norfloxacina	400mg
Ofloxacina y Omidazol	200 / 500 mg
Esparfloxacina	200mg

ANTI DIABETICS

Glibenclamida	2.5/ 5 mg
Gliclazide	30/80 mg
Glimepirida	1/ 2/4 mg
Glimepirida Y Metformina	2 / 500 mg
Glimepirida, Pioglitazona y Metformina	2/15/500 mg
Metformina	500/850/1000 mg
Metformina y Fosfato de Sitagliptina	1000/50, 500/50 mg
Pioglitazona HCL y Metformina HCL	15 / 500 mg ER
Clorhidrato de pioglitazona	30 mg
Repaglinida tabletas USP	1 mg
Saxagliptina	2.5 / 5 mg
Sitagliptina	25/50/100 mg
Voglibosa y Metformina HCL	2/500 mg SR
Disolvente Voglibosa Boca	0.2/0.3 mg

Electrolitos

Polvo de esmectro dioctáedrico	3.0 g
Salas de rehidratación oral	27.9/21.8/20.5/4.2 gm
Salas de rehidratación Oral BP y Zinc Tab.	20.5gm/20mg

Instalaciones acreditadas
OMS, GMP e ISO 9001 para Sistema de Calidad



*Vive la vida de
manera saludable ...*

Globela® Pharma Pvt. Ltd.
"Creando olas en Global Healthcare"

PRESENCIA GLOBAL



AFRICA

 **Nigeria**
  **Kenya**
  **Ivory Coast**
  **Tanzania**
 **Ghana**
  **Sudan**
  **Senegal**
  **Uganda**
West-East Francophone Africa

LATIN AMERICA / CIS

 **Ecuador**
  **Chile**
  **Paraguay**
  **Armenia**
 **Venezuela**
  **Peru**
  **Guyana**
  **Bolivia**
 **Azerbaijan**
  **Tajikistan**
  **Kyrgyzstan**
  **Uzbekistan**

MIDDLE EAST

 **Yemen**
  **Iraq**
  **Syria**

ASIA

 **Sri Lanka**
  **Myanmar**
  **Philippine**
 **Cambodia**
  **Vietnam**
  **Afghanistan**

Certificaciones y Premios



Dun



ISO



GMP



OMS-GMP



Premio UBM-India

Excelencia en Promoción de Exportadores 2017



Premio UBM-India

Globela Pharma Pvt. Ltd. (INDIA)

Regd. Off. : 357-358, G.I.D.C., Sachin, Surat-394230, Gujarat, INDIA
Tel. : +91-261-2398058/59. Website : www.globelapharma.com
Email : info@globelapharma.com

Globela Pharma LLC (USA)

Office : 5509 boulevard East#2, West New York, NJ07093
Cell: +01 9177241489. Website : www.excelmeds.com
Email : priyank@globelapharma.com